herpy

PILGIFTFROSKER

Ranitomeya variabilis

Ranitomeya variabilis er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk på 15-20 mm fra østskråningene av Andes og Amazonas. Den har mange lokale varianter i gult, grønt og blått med svart tegning, yngler i bromelier og er kjent for at hannen bærer rumpetrollene rundt mellom plantens vannsamlinger. En god første art blant de små pilgiftfroskene.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Variable Poison Frog Tidligere navn: *Dendrobates variabilis* Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**15-20 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**I bladkar (f.eks. bromeliaer)**
Egg per legging	**1-10**
Klekking	**10-14 dager**
Larvetid	**60-80 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr og andre rumpetroll**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene**

STELL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et par *R. variabilis* kan holdes i et terrarium på 40 × 40 × 40 cm, og samme størrelse passer til et par eller en trio av slekten. Til 2-3 voksne kan også 30 × 30 × 45 cm brukes, og hver ekstra frosk bør ha ca. 4 liter mer plass.

TEMPERATUR

Hold terrariet på 21-26 °C om dagen og 18-22 °C om natten. Arten trives best rundt 21 °C, tåler 18-27 °C og må aldri komme over 29 °C.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten skal være 70-100 %. Sikt mot nesten 100 % morgen og kveld og 70-75 % midt på dagen. Arten kan klare seg kortvarig ved 50 % hvis den har rent vann å sitte i, men det er en nødløsning.

VANN OG VANNKVALITET

Gi froskene en lav vannskål eller et lite vannparti, og hold vannet så lavt at den minste frosken kan sitte med hode og overkropp over vannet; arten svømmer dårlig.

LYS OG UVB

Froskene er dagaktive og lever i skogens skygge. Lyset er først og fremst til plantene: LED-lys 12-14 timer om dagen er passende. Det er ikke dokumentert at arten trenger UVB, og det brukes vanligvis ikke.

FÔRING

R. variabilis er så liten at den bare kan ta små fôrdyr: spretthaler, vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*) og små bænkebitere. Store voksne kan også ta *D. hydei*.

ATFERD OG HÅNDTERING

R. variabilis er dagaktiv og fredelig. Hannene roper fra forhøyde plasser, og i naturen har arten et fritt paringssystem uten faste par og uten forsvarte territorier.

NATURLIG UTBREDELSE

Peru, Ecuador, Colombia, Brasil og Fransk Guyana.