herpy

PILGIFTFROSKER

Ranitomeya ventrimaculata

Ranitomeya ventrimaculata er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk på under 18 mm fra regnskogen i østlige Ecuador, nordøstlige Peru og sørøstlige Colombia. I snever forstand er den svart med tynne lyserosa striper og blågrått nettmønster på bein og buk. Navnet har i flere tiår dekket andre arter i hobbyen, så det er viktig å vite hva dyrene faktisk er.

Familie: Dendrobatidae Engelsk: Amazonian Poison Frog Tidligere navn: *Dendrobates ventrimaculatus; Dendrobates minutus ventrimaculatus; Dendrobates duellmani; Ranitomeya duellmani* Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**15-17 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**1-4**
Larvetid	**60-80 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr og andre rumpetroll**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene**

STELL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Arten i snever forstand er nesten ukjent i terrarier, og det finnes ingen erfaringer med stell som gjelder akkurat den. Tallene her er de samme som for de andre små Ranitomeya.

TEMPERATUR
Hold terrariet på 21-26 °C om dagen og 18-22 °C om natten. Tallene gjelder de små Ranitomeya generelt: de tåler omtrent 18-27 °C og må aldri komme over 29 °C.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten skal være 70-100 %: nær 100 % morgen og kveld og 70-75 % midt på dagen. Små pilgiftfrosker kan klare kortvarig fall til 50 % hvis de har rent vann å sitte i, men det er en nødløsning.

VANN OG VANNKVALITET
Gi froskene en lav vannskål eller et lite vannparti med 1-2 cm vann, slik at den minste frosken kan sitte med hode og overkropp over vannet; de små pilgiftfroskene svømmer dårlig.

LYS OG UVB
Froskene er dagaktive og lever i skogens skygge. Lyset er først og fremst til plantene: 12-14 timer om dagen med LED-lys er vanlig.

FÔRING
Ranitomeya ventrimaculata er så liten at den bare kan ta små fôrdyr: spretthaler, vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), små tropiske skrukketroll og nyklekte siklader. Store voksne kan ta *D. hydei*.

ATFERD OG HÅNDTERING
Ranitomeya ventrimaculata er dagaktiv og lever mest i løvet på skogbunnen. Hannene roper med en rask summing. Små Ranitomeya er ofte sky, men i et tett beplantet terrarium ser man typisk mer til dem.

NATURLIG UTBREDELSE
Ecuador, Peru og Colombia.