herpy

PILGIFTFROSKER

Brilliant-thighed Poison Frog

Allobates femoralis

Allobates femoralis er en liten, mørk frosk på 3-4 cm fra Amazonas og Guyanaskjoldet med en oransjegul flekk bak armen og en halvmåneformet oransje flekk på låret. Den er dagaktiv og lever på bakken, hannene forsvarer territorier med et høyt rop, og frieriet er et av de lengste blant pilgiftfroskene. Arten tilhører familien Aromobatidae og regnes som ugiftig.

Familie: Aromobatidae Tidligere navn: *Epipedobates femoralis; Phyllobates femoralis; Dendrobates femoralis*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift	**Ingen kjent**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Temperatur, natt	**21-24 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**8-20**
Klekking	**15-20 dager**
Larvetid	**40-50 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Et par *Allobates femoralis* trenger et glassterrarium på minst 60 × 40 × 40 cm. Arten lever nær bakken, så gulvarealet teller mest, men hannene klatrer gjerne litt opp for å kalle.

TEMPERATUR
Om dagen skal det være 25-28 °C og om natten 21-24 °C, altså 3-4 grader lavere. Det daglige svinget tilsvarer forholdene i Fransk Guyana og fremmer avlen.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten skal være høy: 70-80 % midt på dagen og opp mot 100 % morgen og kveld.

VANN OG VANNKVALITET
Gi en lav glass-skål på omtrent 10 cm i diameter med 1-2 cm vann, som froskene lett kommer seg opp av. Den brukes også av hannen når han skal bli kvitt rumpetrollene.

LYS OG UVB
Lyset er først og fremst til plantene. Gi 12 timers lys om dagen, for eksempel fra kl. 7 til 19. Lysstoffrør eller LED på omtrent 6.500 K gir naturlige farger og god plantevekst.

FÔRING
Allobates femoralis lever av små insekter. I terrariet består grunnfôret av vingeløse bananfluer, supplert med spretthaler, helt små sirisser, små voksmøllarver og engplankton. Ungene tar mest spretthaler og små bananfluer.

ATFERD OG HÅNDTERING
Allobates femoralis er dagaktiv, og hannene er territorielle.

NATURLIG UTBREDELSE
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Fransk Guyana, Guyana, Peru og Surinam.