herpy

PILGIFTFROSKER

Sanguine Poison Frog

Allobates zaparo

Allobates zaparo er en liten, dagaktiv frosk på omtrent 3 cm fra regnskogen ved Andesfoten i Ecuador og det nordlige Peru. Voksne har rød rygg, svarte sider, blå buk og gule flekker ved bena og etterligner de giftige *Ameerega bilinguis* og *Ameerega parvula*, men er selv ugiftige. Arten holdes bare sjelden, så stellet bygger på klimaet og på slektningen *Allobates femoralis*.

Familie: Aromobatidae Tidligere navn: *Epipedobates zaparo; Phyllobates zaparo; Dendrobates zaparo*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**3 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift	**Ingen kjent**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Temperatur, natt	**21-23 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**8-20**
Klekking	**15-20 dager**
Larvetid	**40-50 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Allobates zaparo*. Arten holdes bare sjelden, og avl i fangenskap er ikke beskrevet.
TEMPERATUR	Hold terrariet på 24-27 °C om dagen og 21-23 °C om natten. Tallene følger klimaet i Ecuadors lavland ved foten av Andes. Svingningen over året skal være liten, 1-2 °C. Det er ingen vinterhvile.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal være 70-80 % midt på dagen og tett på 100 % morgen og kveld. Et regnanlegg med timer som gir to korte byger om dagen, holder løvlaget fuktig og froskene aktive; en tåkemaskin hjelper i morgen- og kveldstimene.
VANN OG VANNKVALITET	Gi en lav glass-skål med 1-2 cm vann som froskene lett kommer opp av. Skålen brukes av de voksne når rumpetrollene skal settes av. Bruk regnvann, osmosevann eller avklorert springvann, og skift det ofte.
LYS OG UVB	Lyset er først og fremst til plantene: 10-12 timer om dagen med LED-lys med plantevennlig spektrum. Det er ikke dokumentert at *Allobates zaparo* trenger UVB.
FÔRING	I naturen er maur en viktig del av kosten. I terrariet består grunnfôret av flyveudyktige bananfluer (*Drosophila melanogaster*), spretthaler og siktet engplankton, supplert med helt små sirisser og små skrukketroll.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Allobates zaparo* er dagaktiv og lever i løvlaget. Hannene kaller fra oversiden av løvet for å tiltrekke seg hunner.
NATURLIG UTBREDELSE	Ecuador og Peru.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/pilgiftfrosker/allobates-zaparo