herpy

PILGIFTFROSKER

Cainarachi Poison Frog

Ameerega cainarachi

Ameerega cainarachi er en rødrygget pilgiftfrosk på omtrent 3 cm som bare er kjent fra fjellfoten rundt Tarapoto i det nordlige Peru. Arten er truet i naturen, og det finnes bare lite kunnskap om stellet, så veiledningen bygger på klimaet, leveområdet og de nære slektningene *Ameerega bassleri* og *Ameerega pepperi*.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Epipedobates cainarachi; Epipedobates ardens*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**3 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Kjønnsmoden	**12-13 mnd.**
Egg per legging	**22-44**
Klekking	**10 dager**
Larvetid	**50-60 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Ameerega cainarachi*. Arten lever i samme område som *Ameerega bassleri* og *Ameerega pepperi*, og avlstallene er lånt fra dem (se Avl).
TEMPERATUR	Om dagen passer 22-26 °C, og om natten skal temperaturen falle opptil 5 °C, til omtrent 19-22 °C. Forskjellen mellom årstidene er bare 1-2 °C. Det er ingen vinterdvale.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal være 70-100 %: omtrent 70 % midt på dagen og tett på 100 % med tåke morgen og kveld. Sprøyt eller bruk regnanlegg og forstøver et par ganger om dagen.
VANN OG VANNKVALITET	En lav vannskål med 1-2 cm vann er nok, og den skal være lett å komme inn og ut av. Bruk regnvann, osmosevann eller avklort springvann, og bytt vannet annenhver dag, slik at det ikke samler seg bakterier.
LYS OG UVB	Lyset skal først og fremst dekke plantenes behov: LED-lys til plantevekst i 10-12 timer om dagen med en tydelig natt. Behovet for UVB er ikke dokumentert; en svak UVB-lampe (Ferguson-sone 1) er valgfri.
FÔRING	Froskene tar de vanlige små fôrdyrene: bananfluer (*Drosophila melanogaster* og *Drosophila hydei*), spretthaler, små tanglopper, nyklekte sirisser, de minste voksmøllarvene og håvede småinsekter fra engen.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Ameerega cainarachi* er dagaktiv og holder til på skogbunnen. Hannene i slekten er territorielle og roper fra faste plasser.
NATURLIG UTBREDELSE	Peru.