herpy

PILGIFTFROSKER

Yurimaguas Poison Frog

Ameerega hahneli

Ameerega hahneli er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk på 17-22 mm med lyse sidestriper og blå buk, som lever i løvlaget i regnskogen i store deler av Amazonas-lavlandet. Hannen bærer rumpetrollene til rennende vann, og rumpetrollene krever strøm i vannet. Arten er vanlig i naturen, men sjelden i fangenskap.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Epipedobates hahneli; Dendrobates hahneli*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**17-22 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**6-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Kjønnsmoden	**7-12 mnd.**
Egg per legging	**6-33**
Klekking	**4-16 dager**
Larvetid	**55-65 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

STELL

Min. terrarium	**50 × 50 × 50 cm** L × B × H for 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**23-25 °C**
Temperatur, natt	**19-21 °C**
Luftfuktighet	**65-90 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare begrenset kunnskap om stellet av *Ameerega hahneli*, og kravene kan variere mellom de ulike formene og mulige skjulte arter. *Ameerega trivittata* lever i samme del av Amazonas og er bedre kjent i fangenskap.

TEMPERATUR

Ameerega hahneli skal ha 23-25 °C om dagen og 19-21 °C om natten. Lysrør utenfor terrariet kan levere både lys og den nødvendige varmen. Over 28 °C er det risiko for stress; kjøl med en vifte og ekstra sprøyting.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten skal være 65-90 %. Sprøyt eller bruk regnanlegg tre ganger om dagen med osmosevann, gjerne blandet med litt springvann (omtrent 15 %), og la løvlaget tørke litt mellom sprøytingene, slik at det ikke dannes mugg.

VANN OG VANNKVALITET

Det skal alltid være litt vann å gå til, for eksempel i drensrennen eller en lav vannskål med 1-2 cm vann. I tørketiden tømmes ikke rennen, slik at dyrene fortsatt har tilgang til vann.

LYS OG UVB

Lyset kan være lysrør eller LED med plantevennlig spektrum i 10-12 timer. UVB er ikke nødvendig; en svak UVB-pære (Ferguson-sone 1) kan brukes når det er skjul, slik at dyrene kan trekke seg bort fra lyset.

FÔRING

Den lille bananfluen (*Drosophila melanogaster*) er det viktigste fôret. Voksne dyr tar også den store bananfluen (*Drosophila hydei*), men hopper ofte over den fordi den er litt for stor.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten er dagaktiv og lever på bakken, men er mest aktiv tidlig om morgenen og sist på ettermiddagen og om kvelden; resten av dagen er den mer sky.

NATURLIG UTBREDELSE

Brasil, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Fransk Guyana og Surinam.