herpy

PILGIFTFROSKER

Ameerega pepperi

Ameerega pepperi er en liten, svart pilgiftfrosk med gule striper og røde, oransje eller gule tegninger fra det sentrale Peru. Den lever ved bekker i skog i 380-1000 m høyde og er sårbar på grunn av rydding. Det finnes bare lite kunnskap om stellet, som derfor bygger på leveområdet og nære slektninger.

Familie: Dendrobatidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**3 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**8-12 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog og våtmark**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**75-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**22-44**
Larvetid	**35-60 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Ameerega pepperi*. Arten lever ved bekker i fuktig skog i 380-1000 m høyde.

TEMPERATUR

Om dagen skal det være 21-25 °C og om natten 18-21 °C. Temperaturen må ikke komme over 27 °C, siden pilgiftfrosker tåler varme dårlig. Om sommeren kan en vifte eller et kjølig rom være nødvendig. Det er ingen vinterhvile.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten skal være 75-100 %. Sprøyt 1-3 ganger daglig med regnvann eller osmosevann, eller bruk et regnanlegg, slik at løvlaget blir fuktig, men ikke vannmettet. Overskuddsvann må kunne renne av i drenslaget.

VANN OG VANNKVALITET

En lav vannskål med 1-2 cm vann og en stein eller gren som landgang er tilstrekkelig. Bruk regnvann, osmosevann eller avklort vann og bytt det hver 2.-3. dag.

LYS OG UVB

Gi plantevennlig lys i 10-12 timer daglig, med skygge og skjul. UVB er ikke dokumentert som nødvendig for arten, men en svak UVB-kilde (Ferguson-sone 1) kan brukes. Pass på at lyset ikke varmer opp terrariet.

FÔRING

Ameerega pepperi er liten og tar små fôrdyr: bananfluer (mest *Drosophila melanogaster*, mindre *Drosophila hydei*), spretthaler og små tanglopper. Fôr hver eller annenhver dag med så mye som dyrene spiser på en time.

ATFERD OG HÅNDTERING

Hannene er territorielle og roper fra steiner. Arten holdes best som par i et terrarium med mange skjul. Frosker bør ikke håndteres, fordi huden er sart, og håndtering stresser dyrene. Flytt dem med et plastbeger ved rengjøring.

NATURLIG UTBREDELSE

Peru.