herpy

PILGIFTFROSKER

Silverstone's Poison Frog

Ameerega silverstonei

Ameerega silverstonei er en oransjerød pilgiftfrosk på omtrent 4 cm som bare er kjent fra Cordillera Azul på de østlige Andes-skråningene i Peru. Den lever i kjølig fjellskog omkring 1.300-1.500 m høyde, er truet av tap av leveområde og holdes sjelden. Stellet krever et kjølig terrarium.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Epipedobates silverstonei; Dendrobates silverstonei; Phobobates silverstonei*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**4-5 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**8-12 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Fjellskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**50 × 50 × 50 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, natt	**17-20 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Kjønnsmoden	**15-16 mnd.**
Egg per legging	**30-45**
Klekking	**30 dager**
Larvetid	**55-60 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Det finnes bare lite kunnskap om stell og hold av *Ameerega silverstonei*. Den bygger på klimaet i fjellskogen omkring 1.300-1.500 m: kjølig, fuktig og stabilt året rundt.

TEMPERATUR
Om dagen skal det være 20-24 °C, helst i den kjølige enden, og om natten 17-20 °C. Temperaturen må ikke komme over 25 °C. Kjølig luft er ikke noe problem så lenge svingningene er små.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten skal være 70-100 %: omtrent 70 % midt på dagen og opp mot 100 % morgen og kveld. Spray 1-3 ganger daglig med regnvann eller osmosevann, eller bruk et regnanlegg og eventuelt en tåkemaskin.

VANN OG VANNKVALITET
En lav vannskål med 1-2 cm vann er nok. Bruk regnvann, osmosevann eller avklorert vann, og skift det ofte. Vannet skal være kjølig, akkurat som luften. Legg steiner eller greiner i skålen, slik at ungene kan komme opp.

LYS OG UVB
Arten lever på skyggefull skogbunn, så lyset skal være moderat, og det skal være skygge. Lysstoffrør eller LED med plantevennlig spektrum i 10-12 timer daglig er nok.

FÔRING
Ameerega silverstonei tar små til store fôrdyr: store bananfluer (*Drosophila hydei*), nyklekte sirisser, de minste voksmøllarvene og håvede småinsekter fra enga. Spretthaler og små isopoder supplerer.

ATFERD OG HÅNDTERING
Arten er sky og trekker seg ofte inn under løv eller korkbark. Den kan holdes i grupper, men hannene er territorielle, så hold et par eller en gruppe med flere hunner enn hanner.

NATURLIG UTBREDELSE
Peru.