herpy

PILGIFTFROSKER

Cauca Poison Frog

Andinobates bombetes

Andinobates bombetes er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk på 17-19 mm fra skyskogene i Colombias Andesfjell. Den er svart til mørkebrun med røde eller oransje tegninger på forkroppen og er avhengig av vannfylte bromelier. Arten er sårbar i naturen, og det finnes bare lite kunnskap om stell og hold.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Ranitomeya bombetes; Dendrobates bombetes; Minyobates bombetes*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**17-19 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Fjellskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**45 × 50 × 60 cm** L × B × H for 5 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**1-2**
Klekking	**16-24 dager**
Larvetid	**108-112 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stell og hold av *Andinobates bombetes*. Den bygger på leveområdet, en kjølig og svært fuktig fjellskog med tykt løvlag og bromelier, og på oppdrett i fangenskap i Colombia.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen skal være 22-25 °C, og om natten kan den gjerne falle til 18-21 °C som i fjellskogen. Hold temperaturen under 27 °C.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten skal være 80-100 % og aldri under 70 %. Spray to ganger om dagen, morgen og ettermiddag, eller bruk et tåkeanlegg eller regnanlegg med osmosevann eller regnvann.

VANN OG VANNKVALITET

Det er ikke behov for en vannskål; froskene drikker dråper fra planter og sprayvann. Til rumpetrollene brukes bromelier med vann i bladaksene eller små plastbegre med 2-3 cm vann.

LYS OG UVB

Lyset er først og fremst til plantene: plantelys i 10-12 timer om dagen gir døgnrytme og vekst. UVB er neppe nødvendig, men en svak UVB-lyskilde (sone 1) over en del av terrariet skader ikke når det er skygge under plantene.

FÔRING

Fôret er små leddyr: spretthaler, små bananfluer (*Drosophila melanogaster*), små isopoder og nyklekte sirisser. Nyforvandlede unger tar bare spretthaler.

ATFERD OG HÅNDTERING

Andinobates bombetes er dagaktiv og holder seg lavt i terrariet, i løvlaget og ved bromeliene. Hannene kaller særlig om morgenen.

NATURLIG UTBREDELSE

Colombia.