herpy

PILGIFTFROSKER

Samaná Poison Frog

Andinobates daleswansoni

Andinobates daleswansoni er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk på 18-20 mm med knallrødt hode og forkropp og brun bakkropp. Den finnes bare i tåkeskogen på Cordillera Central i Caldas i Colombia. Arten er truet og holdes neppe, så stellet bygger på leveområdets kjølige, våte fjellklima.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Ranitomeya daleswansoni*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**18-20 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Fjellskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-22 °C**
Temperatur, natt	**14-17 °C**
Luftfuktighet	**85-100 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**1-2**
Klekking	**16-24 dager**
Larvetid	**108-152 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stell og hold av *Andinobates daleswansoni*, og arten holdes neppe i fangenskap. Stellet bygger på leveområdet: kjølig, våt tåkeskog med tykt løvlag, mange skjul og bromelier.

TEMPERATUR

Temperaturen er ikke målt i artens leveområde. 18-22 °C om dagen og 14-17 °C om natten passer til tåkeskog i 1.800-2.500 m høyde. Arten tåler varme dårlig, og lengre tid over 25 °C belaster dyrene.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten skal være 85-100 %. Spray løv og planter grundig en eller to ganger om dagen med regnvann eller osmosevann, eller bruk et tåkeanlegg på timer. Bunnen skal være fuktig, men ikke stå våt.

VANN OG VANNKVALITET

Arten skal ikke ha en vanndel. Dyrene får fuktighet fra løv, planter og spraying. Rumpetrollene vokser opp i vann i bromeliers bladkar.

LYS OG UVB

Gi 10-12 timers lys om dagen fra LED, slik at plantene trives. Tåkeskogens underskog er skyggefull, så lyset skal ikke være sterkt, og dyrene skal kunne søke skygge.

FÔRING

Andinobates daleswansoni måler bare 18-20 mm og spiser små leddyr som spretthaler og små bananfluer. Gi fôr annenhver dag, dryss fôrdyrene med kalk de fleste gangene og med vitaminer med D3 1 gang i uken.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten er dagaktiv og lever på bakken i løvlaget, hvor den bruker hull og skjul. Territorieatferd og kall er ikke dokumentert. Et par kan holdes sammen i et terrarium på 45 × 45 × 45 cm.

NATURLIG UTBREDELSE

Colombia.