herpy

PILGIFTFROSKER

Tolima Poison Frog

Andinobates dorisswansonae

Andinobates dorisswansonae er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk på 16-19 mm, svart eller mørkebrun med røde, oransje eller gule flekker. Den er bare kjent fra et lite stykke skog i det nordlige Tolima i Colombia. Arten er sårbar og holdes neppe, så stellet bygger på leveområdets kjølige, våte fjellklima.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Ranitomeya dorisswansonae*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**16-19 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Fjellskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-22 °C**
Temperatur, natt	**14-17 °C**
Luftfuktighet	**85-100 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**1-2**
Klekking	**16-24 dager**
Larvetid	**108-152 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stell og hold av *Andinobates dorisswansonae*, og arten holdes neppe i fangenskap. Stellet bygger på leveområdet: kjølig, våt fjellskog med tett kronetak, tykt løvlag og bromelier.

TEMPERATUR

Temperaturen er ikke målt i artens leveområde. 18-22 °C om dagen og 14-17 °C om natten passer til skog i omtrent 1.800 m høyde. Arten tåler varme dårlig, og lengre tid over 25 °C belaster dyrene. Det skal ikke være noe varmepunkt.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten skal være 85-100 %. Spray løv og planter grundig en eller to ganger om dagen med regnvann eller osmosevann, eller bruk et tåkeanlegg på timer. Bunnen skal være fuktig, men ikke stå våt.

VANN OG VANNKVALITET

Arten skal ikke ha en vanndel. Dyrene får fuktighet fra løv, planter og spraying. Rumpetrollene vokser opp i vann i bromeliers bladkar.

LYS OG UVB

Gi 10-12 timers lys om dagen fra LED, slik at plantene trives. Skogen har tett kronetak, så lyset skal ikke være sterkt, og dyrene skal kunne søke skygge.

FÔRING

Andinobates dorisswansonae måler bare 16-19 mm og spiser små leddyr, i naturen særlig maur. Gi spretthaler og små bananfluer annenhver dag, og dryss fôrdyrene med kalk de fleste gangene og med vitaminer med D3 1 gang i uken.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten er dagaktiv og lever på bakken i løvlaget. Territorieatferd er ikke dokumentert. Et par kan holdes sammen i et terrarium på 45 × 45 × 45 cm. Froskene bør ikke håndteres, fordi huden er sart.

NATURLIG UTBREDELSE

Colombia.