herpy

PILGIFTFROSKER

Yellow-bellied Poison Frog

Andinobates fulguritus

Andinobates fulguritus er en av de minste pilgiftfroskene: bare 14-17 mm, svart med gule eller grønngule striper og en gul, svartmarmorert buk. Den lever i løvlaget i fuktig lavlandsskog i det nordvestlige Colombia og det sentrale og østlige Panama. Arten holdes neppe, og det finnes bare lite kunnskap om stell og hold.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Ranitomeya fulgurita; Dendrobates fulguritus; Minyobates fulguritus*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**14-17 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**1-8**
Larvetid	**60-80 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stell og hold av *Andinobates fulguritus*. Stellet bygger på leveområdet: varm, fuktig lavlandsskog med regn mesteparten av året og et tykt løvlag.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal være 22-25 °C og natten 19-22 °C. Temperaturen må ikke ligge over 27 °C i lengre tid, og over 29 °C er farlig, så terrariet må ikke stå i sol eller tett på en varmekilde. Det skal ikke være noe varmepunkt.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal være 80-100 %. Spray terrariet 1-2 ganger om dagen med regnvann eller osmosevann, slik at løvet holdes fuktig, eller bruk et regnanlegg på timer. Bunnen skal være fuktig, men aldri stå under vann.
VANN OG VANNKVALITET	De voksne froskene trenger ingen vannskål; de får vann gjennom huden fra spraying og det fuktige løvet.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og lever i skygge på skogbunnen. LED-belysning i omtrent 12 timer om dagen er nok til plantene. UVB er ikke nødvendig; et svakt UVB-lys i Ferguson-sone 1 kan brukes hvis det er rikelig med skygge.
FÔRING	I naturen lever pilgiftfrosker av små maur og midd. *Andinobates fulguritus* er så liten at fôrdyrene må være de minste som finnes: spretthaler, små vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*) og små isopoder.
ATFERD OG HÅNDTERING	Arten er dagaktiv og holder seg i løvlaget og ved skjulestedene. Hannene kaller fra faste steder og forsvarer området sitt, så holdformen er et par. Flere hanner i samme terrarium gir stress og kamper. Froskene skal ikke håndteres.
NATURLIG UTBREDELSE	Colombia og Panama.