herpy

PILGIFTFROSKER

Darwin Wallace poison frog

Epipedobates darwinwallacei

Epipedobates darwinwallacei er en liten, svart pilgiftfrosk på 13-20 mm med oransje til gule flekker. Den lever i fjellskogen rundt Mindo i det nordvestlige Ecuador og er truet. Siden 2024 regnes den som et synonym for *Epipedobates espinosai*. Det finnes bare lite kunnskap om stellet.

Familie: Dendrobatidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**13-20 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**8-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, natt	**18-20 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vann	**Vanndel** dybde 2-5 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**10-30**
Klekking	**9-14 dager**
Larvetid	**42-70 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Epipedobates darwinwallacei*, og arten holdes neppe.
TEMPERATUR	Hold 20-24 °C om dagen og 18-20 °C om natten. Det tilsvarer den kjølige enden av det som passer for *Epipedobates tricolor* fra samme høyde. Det klarer seg normalt med romtemperatur og belysningen.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal være 80-100 %. Sprøyt flere ganger om dagen eller bruk et regnanlegg, for eksempel tre ganger daglig i 20-60 sekunder, gjerne supplert med en forstøver.
VANN OG VANNKVALITET	Gi en liten, fast vanndel med 2-5 cm vann og en mild skråning eller rampe, slik at froskene lett kommer opp. I naturen lever arten alltid ved langsomt rennende vann, og en liten pumpe uten kraftig strøm holder vannet i bevegelse.
LYS OG UVB	Lyset er til plantene: lysstoffrør eller LED-lister i omtrent 12 timer om dagen. De nærstående artene trives uten UVB, så det er valgfritt. Vil man gi det, hold deg til Ferguson-sone 1 med rikelig skygge og tett løv.
FÔRING	Froskene får levende, små byttedyr: spretthaler og bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og voksne tar i tillegg den større *Drosophila hydei* og nyklekte sirisser.
ATFERD OG HÅNDTERING	*E. darwinwallacei* er dagaktiv og beveger seg åpent mellom gress og løv. Kallet ligner svært mye på kallet hos de brune *E. espinosai* fra lavlandet. Slektens hanner er territoriale og kaller fra faste plasser.
NATURLIG UTBREDELSE	Ecuador.