herpy

PILGIFTFROSKER

Marañón Poison Frog

Excidobates mysteriosus

Excidobates mysteriosus er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk på omtrent 3 cm fra Cordillera del Cóndor i det nordlige Peru. Den er svart med hvite prikker, formerer seg i vannfylte bromelier i gammel fjellskog og er truet i naturen.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates mysteriosus*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**3 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**17-20 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**I bladkar (f.eks. bromeliaer)**
Kjønnsmoden	**10-12 mnd.**
Egg per legging	**4-8**
Larvetid	**65-75 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Excidobates mysteriosus*. Dyrene lever i fuktig fjellskog tett på bromelier og klipper, med varme dager og kjølige netter.

TEMPERATUR

Temperaturen på artens lokaliteter er ikke målt. 21-25 °C om dagen og 17-20 °C om natten passer til klimaet i forbergene. Froskene tåler varme dårlig, så unngå lengre perioder over 27 °C.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten skal være 80-100 %, og bunnen skal være fuktig hele året. Sprøyt med osmose- eller regnvann en til to ganger daglig, eller bruk et regn- eller tåkeanlegg.

VANN OG VANNKVALITET

En vannskål er ikke nødvendig, fordi froskene får fukt fra sprøytingen og fra de vannfylte bromeliene. Vannet i bromelier og filmbokser skiftes med friskt osmose- eller regnvann hver uke.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og lever i skygge under tett løv, så lyset skal først og fremst gi plantevekst og en dag på 12 timer. UVB er ikke nødvendig, men valgfritt.

FÔRING

Excidobates mysteriosus er stor nok til å ta vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), spretthaler og, når dyrene er voksne, *Drosophila hydei*. I naturen spiser arten maur og små fluer.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten er dagaktiv, og hannen roper høyt og ofte fra plantene og klippene i terrariet. Den holdes best som par, fordi flere dyr sammen kan gi strid. Froskene bør ikke håndteres, fordi de er følsomme for stress.

NATURLIG UTBREDELSE

Peru.