herpy

PILGIFTFROSKER

Polkadot Poison Frog

Oophaga arborea

Oophaga arborea er en liten pilgiftfrosk på 20-22 mm som lever høyt oppe i trærne i den fuktige fjellskogen i det vestlige Panama. Den er svart eller brun med runde gule flekker, yngler i bromelier 10-16 m over bakken, og rumpetrollene lever bare av egg fra hunnen. Arten er kritisk truet.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates arboreus*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**20-22 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Fjellskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Ekspert**

STELL

Min. terrarium	**60 × 45 × 80 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, natt	**15-19 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**I bladkar (f.eks. bromeliaer)**
Egg per legging	**4-8**
Klekking	**14 dager**
Larvetid	**40-50 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ubefruktede egg fra hunnen**
Yngelpleie	**Vokter eggene, bærer rumpetrollene og fôrer rumpetrollene med egg**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Kritisk truet (CR)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes nesten ingen kunnskap om stellet av *Oophaga arborea*, og arten er nesten ukjent i fangenskap.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal ligge på 20-24 °C, og om natten skal den falle minst 4-5 °C, til omtrent 15-19 °C. Det svarer til tåkeskogens klima med en årsmiddeltemperatur omkring 19 °C.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal ligge på 70-80 % om dagen og stige til 100 % om natten. Bruk rikelig med tåke og regn, og la terrariet tørke raskt av etterpå ved hjelp av en vifte; stillestående, våt luft er farlig.
VANN OG VANNKVALITET	En vannskål er ikke nødvendig. Froskene får fuktighet fra tåke, regn og de vannfylte bromeliene, som også brukes til rumpetrollene.
LYS OG UVB	Arten lever høyt oppe i kronene, der lyset er sterkere enn på skogbunnen, men tåken demper det. Bruk LED eller lysrør med høy virkningsgrad, gjerne omtrent 6.500 K, 10-12 timer i døgnet, nok til at plantene og bromeliene kan vokse.
FÔRING	Voksne dyr får små, flygeudyktige bananfluer, spretthaler, nyklekte mikrosiriss og markplankton; de samme fôrdyrene brukes til slektens øvrige arter. I naturen er fôret små leddyr, og det er derfra giften kommer.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Oophaga arborea* er en dagaktiv trefrosk som sjelden ses på bakken.
NATURLIG UTBREDELSE	Panama.