herpy

PILGIFTFROSKER

Granular Poison Frog

Oophaga granulifera

Oophaga granulifera er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk på 19-22 mm fra Stillehavssiden av Costa Rica og det ytterste vestlige Panama. Huden er tydelig kornet, ryggen rød, oransje eller olivengrønn, og ben og buk er blågrønne til turkise. Arten lever langs skyggefulle skogbekker, og hunnen fører rumpetrollene sine med ubefruktede egg.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates granuliferus*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**19-22 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**6 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Kjønnsmoden	**12-18 mnd.**
Egg per legging	**2-5**
Klekking	**19-20 dager**
Larvetid	**87-212 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ubefruktede egg fra hunnen**
Yngelpleie	**Vokter eggene, bærer rumpetrollene og fører rumpetrollene med egg**

STELL

Min. terrarium	**80 × 40 × 40 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**17-21 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Oophaga granulifera*, og arten er sjelden i hobbyen.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal ligge på 21-25 °C, og froskene er mest aktive ved 20-22 °C. Om natten skal temperaturen falle 4-5 °C, til omtrent 17-21 °C. Årstidsvariasjonen er minimal, omtrent 1-2 °C.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal ligge på 80-90 %, og 100 % tidlig om morgenen og sent på dagen, når terrariet sprøytes. Selv i tørketiden faller fuktigheten langs bekkene sjelden under 80 %, og det er også bunnen for terrariet.
VANN OG VANNKVALITET	Et lavt vannfat på 1-2 cm dybde, for eksempel en lav skål nedgravd i bunnen eller en vanndel mellom steinene, gir drikkevann og luftfuktighet. Froskene er dårlige svømmere, så vannet må være så lavt at de kan stå på bunnen.
LYS OG UVB	Arten lever i skyggefull skogbunn, så lyset må først og fremst dekke plantenes behov. Bruk LED eller lysrør med høy virkningsgrad, gjerne omtrent 6.500 K, 10-12 timer i døgnet; det passer til dagslengden i Costa Rica nær 9° nord.
FÔRING	Voksne dyr får små, flygeudyktige bananfluer, spretthaler, nyklekte mikrosiriss, de minste voksmøllarvene og markplankton.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Oophaga granulifera* er sky og lever svært skjult, især i tørketiden, da den nesten helt stenger seg inne. Hannene forsvarer en kalleplass og kaller mest i regntiden; kamper er sjeldne og følger etter lydsignaler.
NATURLIG UTBREDELSE	Costa Rica og Panama.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/pilgiftfrosker/oophaga-granulifera