herpy

PILGIFTFROSKER

Lehmann's Poison Frog

Oophaga lehmanni

Oophaga lehmanni er en sjelden, dagaktiv pilgiftfrosk fra et lite område i det vestlige Colombia, svart eller mørkebrun med brede bånd av rødt, oransje eller gult. Den er kritisk truet i naturen, og bare oppdrettede dyr hører hjemme i et terrarium. Arten krever en erfaren holder: den tåler ikke varme, og rumpetrollene lever utelukkende av ubefruktede egg fra hunnen.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates lehmanni*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**4-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**60 × 60 × 60 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-24 °C**
Temperatur, natt	**17-19 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På blader over vann**
Egg per legging	**3-10**
Klekking	**14-28 dager**
Larvetid	**60-90 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ubefruktede egg fra hunnen**
Yngelpleie	**Vokter eggene, bærer rumpetrollene og fôrer rumpetrollene med egg**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Kritisk truet (CR)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Et par av *O. lehmanni* må ha et terrarium på minst 60 × 60 × 60 cm (lengde × bredde × høyde), og større er bedre, særlig til avl. Arten er forholdsvis stor og territorial, så ekstra plass og mange skjul forebygger krangling.

TEMPERATUR
O. lehmanni kommer fra kjølig fjellregnskog og er mer følsom for varme enn de fleste pilgiftfrosker. Den trives best ved 22-24 °C i dagtimene, og 24-25 °C bør ikke overskrides, heller ikke i kort tid.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten skal ligge på 70-100 %: høy morgen og kveld, gjerne med tåke, slik at den når opp i 100 %, og litt lavere midt på dagen, ned til omkring 70 %.

VANN OG VANNKVALITET
Froskene trenger ikke en vannskål, fordi fuktigheten dekker behovet deres.

LYS OG UVB
Frosken er dagaktiv og lever i skygge under skogens løvtak. Det er ingen dokumentasjon for at arten trenger UVB når fôret drysses med D3-vitamin, men svak UVB-belysning (Ferguson-sone 1) kan brukes uten skade.

FÔRING
O. lehmanni spiser bare levende, små leddyr. Hovedfôret er flygeløse bananfluer, og arten er stor nok til også å ta de større *Drosophila hydei*.

ATFERD OG HÅNDTERING
O. lehmanni er dagaktiv og rolig, men hannene er territoriale og kaller fra faste plasser. Hold arten parvis. Hanner er svært aggressive mot hverandre og undertrykker hverandre, og den underlegne hannen kan dø av stress.

NATURLIG UTBREDELSE
Colombia.