herpy

PILGIFTFROSKER

## Little Devil Poison Frog

# *Oophaga sylvatica*

*Oophaga sylvatica* er en av de største pilgiftfroskene i slekten *Oophaga*: en dagaktiv skogbunnsfrosk på 3-4 cm fra regnskogene i Ecuador og Colombia, kjent for de mange fargeformene i oransje, rødt og gult på svart eller brun bunn og for den utholdende yngelpleien.

Familie: Dendrobatidae  Tidligere navn: *Dendrobates sylvaticus*

**FAKTABOKS**

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **3-4 cm**<br>snute-kloakk-lengde |
| Levealder | **10-15 år** |
| Aktiv | **Om dagen** |
| Levevis | **Bakkelevende** |
| Biotop | **Regnskog** |
| Hudgift i naturen | **Mild** |
| Hudgift i fangenskap | **Ingen**<br>Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge |
| Vanskelighetsgrad | **Erfaren** |

### STELL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **60 × 60 × 60 cm**<br>L × B × H for 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **23-26 °C** |
| Temperatur, natt | **21-23 °C** |
| Luftfuktighet | **70-100 %** |
| Vann | **Vannskål**<br>dybde 1-2 cm |
| UVB | **Valgfritt**<br>Ferguson-sone 1 |
| Kosthold | **Små leddyr (spretthaler, bananfluer)** |
| Holdes | **Parvis** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Eggleggende** |
| Utvikling | **Rumpetrollene bæres til vann** |
| Egglegging | **På bakken** |
| Kjønnsmoden | **18-24 mnd.** |
| Egg per legging | **4-20** |
| Klekking | **10-16 dager** |
| Larvetid | **75-90 dager**<br>fra klekking til metamorfose |
| Larvefôr | **Ubefruktede egg fra hunnen** |
| Yngelpleie | **Vokter eggene, bærer rumpetrollene og fôrer rumpetrollene med egg** |

### VERN OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Liste II** |
| IUCN | **Nær truet (NT)** |

## Stell i korte trekk

**TERRARIET**
Et terrarium på minst 60 × 60 × 60 cm (lengde, bredde, høyde) passer til ett par. Hannene er sterkt territorielle, og hunnene holder også revir og danner rangorden når det er mange dyr.

**TEMPERATUR**
*Oophaga sylvatica* kommer fra et lavland med nesten konstant varme, så temperaturen må holdes stabil: 23-26 °C om dagen og 21-23 °C om natten.

**LUFTFUKTIGHET OG DUSJING**
Luftfuktigheten holdes på 70-80 % i løpet av dagen og går mot 100 % tidlig om morgenen og sent om kvelden, slik som når tåke og regn driver inn over skogen. Ved middagstid kan den falle til omtrent 70 %.

**VANN OG VANNKVALITET**
En lav vannskål med 1-2 cm vann og en rampe av stein eller mose er nok til voksne dyr; froskene er dårlige svømmere, og vannet må høyst nå omtrent tre fjerdedeler av dyrets høyde når det står. Dybden er lånt fra en nær slektning.

**LYS OG UVB**
Lyset skal først og fremst passe til plantene. Lysstoffrør eller LED-lys på omtrent 6.500 K gir naturlige farger og god plantevekst; velg lyskilder med høy virkningsgrad og en reflektor.

**FÔRING**
Voksne dyr tar de vanlige små fôrdyrene: spretthaler, små og store bananfluer, mikrosiklader, små voksmøllarver, støvlus, ovnskre og fint siktet engplankton.

**ATFERD OG HÅNDTERING**
Hannene er sterkt territorielle og roper fra morgen til kveld; ropet er kort og høyt, omtrent fem lyder i sekundet. Rivaliserende hanner roper i kapp, rykker frem og trekker seg tilbake og kan ende i bryting.

**NATURLIG UTBREDELSE**
Ecuador og Colombia.