herpy

PILGIFTFROSKER

Vicente's Poison Frog

Oophaga vicentei

Oophaga vicentei er en liten, fargesterk og dagaktiv pilgiftfrosk på opptil 24 mm som bare finnes i det sentrale Panama. Fargene varierer fra gul og rød til blå, grå og grønn, ofte med et svart nettmønster. Arten er truet i naturen, og det finnes bare lite kunnskap om stellet.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates vicentei*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**12-24 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**19-21 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**I bladkar (f.eks. bromeliaer)**
Egg per legging	**1-12**
Klekking	**10-14 dager**
Larvetid	**42-56 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ubefruktede egg fra hunnen**
Yngelpleie	**Vokter eggene, bærer rumpetrollene og fôrer rumpetrollene med egg**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Oophaga vicentei*.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal være 22-26 °C og natten 19-21 °C. Froskene tåler varme dårlig, så unngå lengre perioder over 28 °C. Plasser terrariet kjølig, sørg for ventilasjon, og bruk lamper som ikke varmer. Arten har ingen vinterdvale.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal være 80-100 % og aldri under 70 %. Sprøyt terrariet grundig en til to ganger om dagen med vann uten kalk og klor (regnvann eller osmosevann), slik at blader og bromelier er våte.
VANN OG VANNKVALITET	En flat vannskål med 1-2 cm vann er nok, for froskene er dårlige svømmere. Hold den ren, og skift vannet hver dag eller annenhver dag.
LYS OG UVB	UVB er neppe nødvendig, men litt UVB (Ferguson-sone 1) skader ikke og er valgfritt. Plantelys i 10-12 timer om dagen holder plantene i live, og natten må være mørk. Lampene må ikke varme opp terrariet over 26 °C.
FÔRING	Arten må ha svært små fôrdyr. Grunnfôret er små, vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*) og spretthaler, supplert med bladlus, små termitter og små bænkebidere.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Oophaga vicentei* er dagaktiv. Hannen kaller fra et sted høyt oppe og finner ynglestedet. Hunner kan spise andre hunners egg, så et par er det sikreste. Froskene bør ikke håndteres, fordi huden er tynn og følsom.
NATURLIG UTBREDELSE	Panama.