herpy

PILGIFTFROSKER

Lovely Poison Frog

Phyllobates lugubris

Phyllobates lugubris er en liten, svart pilgiftfrosk på 19-24 mm med to gule, gyldne eller oransje striper langs ryggen. Den lever på skogbunnen i lavlandsregnskogen på den karibiske siden av Mellom-Amerika, fra Nicaragua til Panama. Den ses av og til i handelen, men det finnes lite kunnskap om stell.

Familie: Dendrobatidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**19-24 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**10-20 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-3 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**7-21**
Larvetid	**45-80 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes lite kunnskap om stell av *Phyllobates lugubris*.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal være 21-25 °C og natten 18-21 °C, som for *Phyllobates vittatus*. Pilgiftfrosker er svært følsomme for varme: over 27 °C bør unngås, og flere timer omkring 29 °C kan være dødelig.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal være 80-100 %, og jorden og løvlaget skal alltid være fuktige. Sprøyt terrariet grundig 1-2 ganger om dagen med regnvann, osmosevann eller avklort vann, eller bruk et regn- eller tåkeanlegg.
VANN OG VANNKVALITET	De voksne froskene drikker ikke, men tar opp vann gjennom huden, og en lav vannskål med 1-3 cm vann er nok. *Phyllobates vittatus* setter pris på en liten vanndel, og i naturen bæres rumpetrollene til vassdrag.
LYS OG UVB	Arten lever på skogbunnen, der lyset er dempet, og UVB er ikke dokumentert som nødvendig. En svak UVB-lampe i Ferguson-sone 1 er valgfri; gi da alltid skygge.
FÔRING	*Phyllobates lugubris* spiser i naturen mest maur og midd. I terrariet gis små leddyr: vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), spretthaler, små skrukketroll og nyklekte sirisser. Byttet skal være under 3 mm langt.
ATFERD OG HÅNDTERING	Arten er dagaktiv og lever skjult mellom løv og planter. Hannene kaller fra skjulte plasser og forsvarer territoriet sitt mot andre hanner, så flere hanner i samme terrarium kan gi stress.
NATURLIG UTBREDELSE	Nicaragua, Costa Rica og Panama.