herpy

PILGIFTFROSKER

Golden Poison Frog

Phyllobates terribilis

Phyllobates terribilis er den største av pilgiftfroskene, 4-5 cm, og i naturen et av de giftigste dyrene man kjenner. Den lever bare i et lite stykke regnskog ved Colombias stillehavskyst. Oppdrettede dyr er praktisk talt ugiftige, dristige og alltid fremme, og arten er blitt en av terrarieholdernes mest holdte pilgiftfrosker.

Familie: Dendrobatidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**4-5 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**8-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Kraftig**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 50 × 50 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Kjønnsmoden	**16-20 mnd.**
Egg per legging	**10-30**
Klekking	**10-25 dager** ved 22-24 °C
Larvetid	**30-60 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et par av *Phyllobates terribilis* skal ha et terrarium på minst 60 × 50 × 50 cm. En gruppe på 4-6 dyr skal ha minst 90 × 50 × 50 cm, og flere dyr krever mer gulvareal.

TEMPERATUR

Om dagen skal det være 21-25 °C, gjerne et par grader varmere øverst i terrariet, og om natten 18-21 °C, som tilsvarer romtemperatur. Temperaturen må ikke komme over 27 °C over lengre tid.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten skal være høy, 70-100 %, men bunnen må ikke bli sumpete. Et regnanlegg er det enkleste, for eksempel med tre sprøytinger om dagen på 20-60 sekunder, avhengig av dysene.

VANN OG VANNKVALITET

Gi en eller flere små vannskåler med omkring 2 cm vann, for eksempel underskåler eller halve paranøttskall, som dyrene lett kommer opp av.

LYS OG UVB

Lyset er først og fremst til plantene. Lysstoffrør eller LED-lister i omkring 12 timer om dagen er nok, og dagslengden kan gjerne variere litt gjennom året.

FÔRING

Phyllobates terribilis tar større bytte enn de fleste pilgiftfrosker. I naturen er maur hovedføden, men den tar mange slags små leddyr.

ATFERD OG HÅNDTERING

Phyllobates terribilis er dagaktiv, dristig og nysgjerrig og er fremme mesteparten av dagen med en kort pause midt på dagen. Hannene kaller med en myk, fuglelignende trille, særlig etter sprøyting.

NATURLIG UTBREDELSE

Colombia.