herpy

PILGIFTFROSKER

Amazonian Poison Frog

Ranitomeya amazonica

Ranitomeya amazonica er en bitteliten, dagaktiv pilgiftfrosk på 16-19 mm fra Amazonas omkring Iquitos i Peru og Leticia i Colombia. Den er svart med røde, oransje eller gule striper og blågrå marmorering på bena, yngler i bromelier og regnes som en av de letteste små *Ranitomeya* å holde og få til å yngle.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates amazonicus*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**16-19 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**I bladkar (f.eks. bromeliaer)**
Kjønnsmoden	**5-8 mnd.**
Egg per legging	**2-8**
Klekking	**10-14 dager**
Larvetid	**60-80 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr og andre rumpetroll**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et par eller en trio *Ranitomeya amazonica* skal ha et terrarium på minst 40 × 40 × 40 cm. Skal det være flere frosker, så regn med omtrent 20 liter ekstra plass per dyr, og velg heller et høyt enn et lavt terrarium.

TEMPERATUR

Hold terrariet på 21-26 °C om dagen og 18-21 °C om natten. Froskene er mest aktive og yngler best i den varme enden, ved 24-26 °C.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten skal ligge på 70-100 %, helst 80-100 %. Sprøyt hver dag, gjerne morgen og kveld, slik at fuktigheten er nær 100 % etter sprøytingen og faller til omtrent 70-75 % midt på dagen. Bruk osmosevann eller regnvann.

VANN OG VANNKVALITET

Ranitomeya amazonica svømmer dårlig, så vannet må være lavt og lett å komme opp av. Bruk en lav vannskål eller et lite vannparti med 1-2 cm vann, slik at den minste frosken kan sitte med hode og overkropp over vannet.

LYS OG UVB

Froskene er dagaktive og lever i skogens skygge. Lyset er først og fremst til plantene: gi 12-14 timer LED-plantelys om dagen. *Ranitomeya amazonica* har ikke noe kjent behov for UVB, så UVB er valgfritt.

FÔRING

Ranitomeya amazonica er så liten at den bare kan ta små fôrdyr. Unger og voksne tar vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og store voksne kan også ta *D. hydei* og nyklekkede fårekyllinger.

ATFERD OG HÅNDTERING

Ranitomeya amazonica er dagaktiv, men ofte sjenert, og særlig unge dyr gjemmer seg mye. I et tett beplantet terrarium med mange visne blader kommer froskene mer fram.

NATURLIG UTBREDELSE

Peru og Colombia.