herpy

PILGIFTFROSKER

## Blessed Poison Frog

# *Ranitomeya benedicta*

*Ranitomeya benedicta* er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk på 16-20 mm fra lavlandsskogen i det nordlige Peru. Det klart røde hodet og den svarte kroppen med blått nettmønster gjør den til en av de mest fargerike i slekten. Til 2008 ble den regnet som en underart av *Ranitomeya fantastica*. I naturen er den sårbar, men oppdrettede dyr yngler villig i et godt innredet terrarium.

Familie: Dendrobatidae

**FAKTABOKS**

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **16-20 mm**<br>snute-kloakk-lengde |
| Levealder | **5-10 år** |
| Aktiv | **Om dagen** |
| Levevis | **Trelevende og bakkelevende** |
| Biotop | **Regnskog** |
| Hudgift i naturen | **Mild** |
| Hudgift i fangenskap | **Ingen**<br>Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge |
| Vanskelighetsgrad | **Øvet** |

### STELL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **40 × 40 × 40 cm**<br>L × B × H for 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **21-26 °C** |
| Temperatur, natt | **18-22 °C** |
| Luftfuktighet | **70-100 %** |
| Vann | **Vannskål**<br>dybde 1-2 cm |
| UVB | **Valgfritt** |
| Kosthold | **Små leddyr (spretthaler, bananfluer)** |
| Holdes | **Parvis eller i gruppe** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Eggleggende** |
| Utvikling | **Rumpetrollene bæres til vann** |
| Egglegging | **På bakken** |
| Egg per legging | **2-6** |
| Klekking | **10-14 dager** |
| Larvetid | **60-114 dager**<br>fra klekking til metamorfose |
| Larvefôr | **Alger/planter og ferdigfôr** |
| Yngelpleie | **Vokter eggene og bærer rumpetrollene** |

### VERN OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Liste II** |
| IUCN | **Sårbar (VU)** |

## Stell i korte trekk

**TERRARIET**

Et par *R. benedicta* kan holdes i et terrarium på 40 × 40 × 40 cm. To par skal ha et liggende terrarium på omtrent 75 liter, og større er alltid bedre, fordi et stort terrarium holder klimaet mer stabilt.

**TEMPERATUR**

Hold terrariet på 21-26 °C om dagen og 18-22 °C om natten. Arten trives best ved omtrent 21-24 °C, og temperaturen må ikke komme over 27 °C over lengre tid.

**LUFTFUKTIGHET OG DUSJING**

Luftfuktigheten skal ligge på 70-100 %. En god rytme er nesten 100 % morgen og kveld og 70-75 % midt på dagen, slik at terrariet tørker litt opp mellom sprøytingene.

**VANN OG VANNKVALITET**

En lav vannskål eller en bromelie med vann i bladhjørnene er nok.

**LYS OG UVB**

*R. benedicta* er dagaktiv, og lyset er først og fremst til plantene. Gi 12-14 timer lys om dagen med lysstoffrør eller LED på timer, hele året rundt, og mørke om natten. Det tilsvarer dagslengden i tropene.

**FÔRING**

Grunnfôret er små levende leddyr. Dyr i alle aldre tar flygeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og voksne kan også ta den større *D. hydei*.

**ATFERD OG HÅNDTERING**

*R. benedicta* er dagaktiv og kan være litt sjenert, særlig som ung, men i et tett beplantet terrarium med gjemmesteder ses voksne dyr mye. Hannen sitter åpent framme og kvekker.

**NATURLIG UTBREDELSE**

Peru.