herpy

PILGIFTFROSKER

Tahuayo Poison Frog

Ranitomeya flavovittata

Ranitomeya flavovittata er en av de minste artene i slekten: bare 15-17 mm fra snute til kloakk. Den er skarpt gul med svart tegning, brune bein og lyseblå buk og kommer fra regnskogen nær Iquitos i nordøstlige Peru. Den er dagaktiv og litt sky, yngler villig i filmbokser og bromelier og er et godt valg for en holder med litt erfaring.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates flavovittatus*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**15-17 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**I bladkar (f.eks. bromeliaer)**
Kjønnsmoden	**5-8 mnd.**
Egg per legging	**2-6**
Klekking	**10-14 dager**
Larvetid	**60-80 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr og ubefruktede egg fra hunnen**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene og fôrer rumpetrollene med egg**

STELL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et par *R. flavovittata* skal ha et terrarium på minst 30 × 30 × 45 cm, men større er alltid bedre. En gruppe på 3-4 frosker skal ha minst 45 × 45 × 45 cm, og hver ekstra frosk krever mer plass.

TEMPERATUR

Hold terrariet på 21-26 °C om dagen og 18-21 °C om natten. Nattetemperaturen er lånt fra beslektede arter. Temperaturen må ikke komme over 27 °C over lengre tid, og over 29 °C kan være dødelig.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten skal være 70-100 %. Arten kan kortvarig klare omtrent 50 % hvis den har tilgang til rent vann, men det er en nødløsning og kan være dødelig hvis det varer ved. Spray daglig, og bruk osmosevann eller regnvann.

VANN OG VANNKVALITET

Gi froskene en lav vannskål eller et lite vannparti, og hold vannet så lavt at den minste frosken kan sitte med hode og overkropp over vannet: arten svømmer dårlig. Vanndybden bør være 1-2 cm.

LYS OG UVB

Froskene er dagaktive og lever i skyggen i regnskogen. Lyset er først og fremst til plantene: LED-lys 12-14 timer om dagen er passende. Det er ikke dokumentert at arten trenger UVB, og det brukes vanligvis ikke.

FÔRING

R. flavovittata er så liten at den bare kan ta små fôrdyr. Unger og de fleste voksne spiser vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og store voksne kan også ta *D. hydei* og nyklekte siklader.

ATFERD OG HÅNDTERING

R. flavovittata er dagaktiv, rask og litt sky. Froskene blir dristigere hvis terrariet er tett beplantet og har mange skjul, og de venner seg til deg hvis du ser på dem gjennom glasset. Hannene roper fra åpne plasser.

NATURLIG UTBREDELSE

Peru.