herpy

PILGIFTFROSKER

Mimic Poison Frog

Ranitomeya imitator

Ranitomeya imitator er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk på 16-20 mm fra nordlige Peru. Hver lokale variant etterligner en annen giftig frosk i samme område, og arten var det første amfibiet der man påviste ekte monogami: paret passer ungene sammen, og hunnen fôrer hvert rumpetroll med ubefruktede egg.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates imitator; Ranitomeya intermedia*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**16-20 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Kjønnsmoden	**5-8 mnd.**
Egg per legging	**1-8**
Klekking	**7-16 dager**
Larvetid	**60-80 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr og ubefruktede egg fra hunnen**
Yngelpleie	**Vokter eggene, bærer rumpetrollene og fôrer rumpetrollene med egg**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et par *R. imitator* skal ha et terrarium på minst 45 × 45 × 45 cm. Froskene klatrer gjerne, så høyden utnyttes. Innred med et drenslag, en bunn som holder på fuktigheten, og et tykt lag visne blader.

TEMPERATUR

Hold terrariet på 21-26 °C om dagen og 18-22 °C om natten. Arten trives best ved omtrent 21-24 °C. Temperaturen må ikke komme over 27 °C over lengre tid, og over 29 °C er farlig: varme er farligere enn kulde.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten skal ligge på 70-100 %. Sikt mot nesten 100 % morgen og kveld og 70-75 % midt på dagen, slik at terrariet får tørke litt opp mellom sprayingene.

VANN OG VANNKVALITET

En lav vannskål eller en bromelie med vann i bladhjørnene er nok. Vannet må ikke være dypere enn at den minste frosken kan sitte i det med hode og overkropp over vannet, for arten svømmer dårlig. 1-2 cm er et passende nivå.

LYS OG UVB

R. imitator er dagaktiv og lever i skyggen under skogens tak. Lyset er først og fremst til plantene. Gi LED-lys 12-14 timer om dagen, for eksempel kl. 8-20.

FÔRING

Grunnfôret er små leddyr: flygeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), spretthaler og små bænkebitere. Store voksne dyr kan også ta den større *D. hydei*.

ATFERD OG HÅNDTERING

R. imitator er dristig og dagaktiv og ses ofte fritt fremme i terrariet. Hannen roper fra faste plasser, og begge kjønn forsvarer parets territorium mot artsfrender.

NATURLIG UTBREDELSE

Peru.