herpy

PILGIFTFROSKER

Red-backed Poison Frog

Ranitomeya reticulata

Ranitomeya reticulata er en av de minste pilgiftfroskene: bare 13-17 mm, med kobberrød til oransje rygg og blågrå bein med svart nettmønster. Den lever i lavlandsskogen i Amazonas i nordøstlige Peru og østlige Ecuador. I terrariet er den dristig og livlig, men krevende, fordi eggene er vanskelige å finne og ungene er vanskelige å få til å vokse opp.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates reticulatus*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**13-17 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per legging	**1-8**
Klekking	**10-14 dager**
Larvetid	**60-80 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Et par *R. reticulata* trenger et terrarium på minst 30 × 30 × 45 cm, gjerne 40 × 40 × 45 cm eller større. Froskene klatrer gjerne, så høyden utnyttes.

TEMPERATUR
Hold terrariet på 22-26 °C om dagen og 18-22 °C om natten. Temperaturen må ikke komme over 27 °C over lengre tid, og over 29 °C kan være dødelig. Varme er alltid farligere enn kulde.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten skal ligge på 70-100 %. En god rytme er nesten 100 % morgen og kveld og 70-75 % midt på dagen, slik at terrariet tørker litt opp mellom sprøytingene.

VANN OG VANNKVALITET
En lav vannskål eller en bromelie med vann i bladhjørnene er nok.

LYS OG UVB
R. reticulata er dagaktiv, og lyset er først og fremst til plantene. Gi 12-14 timer lys om dagen, for eksempel LED fra kl. 8 til 20, og mørke om natten. Det er ikke dokumentert at arten trenger UVB.

FÔRING
Grunnfôret er små leddyr. Unger og de fleste voksne tar flygeudyktige bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og store voksne kan også ta den større *D. hydei*.

ATFERD OG HÅNDTERING
R. reticulata er lynrask og dristig og sees ofte fritt fremme, som om den ikke aner hvor liten den er. Hannene roper fra faste plasser med en høy, kort summing.

NATURLIG UTBREDELSE
Peru og Ecuador.