herpy

PILGIFTFROSKER

Sira Poison Frog

Ranitomeya sirensis

Ranitomeya sirensis er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk på 15-25 mm fra det østlige Peru, nordlige Bolivia og vestligste Brasil. Arten omfatter formene som tidligere ble solgt som «lamasi» og «biolat», og de fleste av dem hører til de letteste pilgiftfroskene å få til å yngle. Froskene trives i grupper når det er nok plass.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Ranitomeya lamasi; Dendrobates lamasi; Dendrobates sirensis*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**15-25 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**I bladkar (f.eks. bromeliaer)**
Kjønnsmoden	**5-8 mnd.**
Egg per legging	**1-8**
Klekking	**10-14 dager**
Larvetid	**58-80 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Vokter eggene og bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Et par eller en trio *R. sirensis* trenger et terrarium på minst 45 × 45 × 45 cm. Arten har nytte av litt ekstra gulvplass og tett plantedekke, og den store høylandsformen trives best i et større terrarium.

TEMPERATUR
Hold terrariet på 21-25 °C om dagen og 18-21 °C om natten. Temperaturen må ikke komme over 27 °C over lengre tid, og over 29 °C er farlig.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten skal ligge på 80-100 %. Arten tåler bare kortvarig ned til 50 %, og bare hvis den har tilgang til vann; lav fuktighet uten vann kan raskt bli dødelig.

VANN OG VANNKVALITET
En lav vannskål eller en bromelie med vann i bladhjørnene er nok. Hold vannet 1-2 cm dypt, slik at den minste frosken kan sitte i det med hode og overkropp over vannet.

LYS OG UVB
R. sirensis er dagaktiv, og lyset er først og fremst til plantene. Gi 12-14 timer lys om dagen med lysstoffrør eller LED og mørke om natten. Det er ikke dokumentert at arten trenger UVB.

FÔRING
Grunnfôret er små leddyr: vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), spretthaler og små skrukketroll. Voksne tar også den større *D. hydei* og nyklekte siklader.

ATFERD OG HÅNDTERING
R. sirensis er ofte sky og gjemmer seg gjerne, så et tett beplantet terrarium med mange skjulesteder gir mest å se på. Hannen roper for å lokke en hunn til et eggleggingssted.

NATURLIG UTBREDELSE
Bolivia, Brasil og Peru.