herpy

PILGIFTFROSKER

## Summers' Poison Dart Frog

# *Ranitomeya summersi*

*Ranitomeya summersi* er en liten, dagaktiv pilgiftfrosk på 16-21 mm fra Huallaga-dalen i Peru, oransje eller kobberfarget med svart marmorering og en svart maske over øynene. Arten er truet i naturen, eggene er vanskelige å finne, og froskene er raske og sky, så den egner seg best for en holder med erfaring med pilgiftfrosker.

Familie: Dendrobatidae

**FAKTABOKS**

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **16-21 mm**<br>snute-kloakk-lengde |
| Levealder | **5-10 år** |
| Aktiv | **Om dagen** |
| Levevis | **Trelevende og bakkelevende** |
| Biotop | **Regnskog** |
| Hudgift i naturen | **Mild** |
| Hudgift i fangenskap | **Ingen**<br>Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge |
| Vanskelighetsgrad | **Erfaren** |

### STELL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **30 × 30 × 45 cm**<br>L × B × H for 3 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **21-26 °C** |
| Temperatur, natt | **18-21 °C** |
| Luftfuktighet | **70-100 %** |
| Vann | **Vannskål**<br>dybde 1-2 cm |
| UVB | **Valgfritt** |
| Kosthold | **Små leddyr (spretthaler, bananfluer)** |
| Holdes | **Parvis eller i gruppe** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Eggleggende** |
| Utvikling | **Rumpetrollene bæres til vann** |
| Egglegging | **På bakken** |
| Egg per legging | **4-9** |
| Klekking | **10-14 dager** |
| Larvetid | **60-80 dager**<br>fra klekking til metamorfose |
| Larvefôr | **Alger/planter og ferdigfôr** |
| Yngelpleie | **Vokter eggene og bærer rumpetrollene** |

### VERN OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Liste II** |
| IUCN | **Sterkt truet (EN)** |

## Stell i korte trekk

**TERRARIET**

Et par eller en liten trio av *R. summersi* kan holdes i et terrarium på minst 30 × 30 × 45 cm (lengde × bredde × høyde), og større er bedre.

**TEMPERATUR**

Hold terrariet på 21-26 °C om dagen og 18-21 °C om natten. Temperaturen må ikke komme over 27 °C over lengre tid, og over 29 °C er livsfarlig. Arten tåler varme dårligere enn kulde.

**LUFTFUKTIGHET OG DUSJING**

Luftfuktigheten skal ligge på 70-100 %. En god rytme er nær 100 % morgen og kveld og 70-75 % midt på dagen, slik at terrariet kan tørke litt opp mellom sprøytingene.

**VANN OG VANNKVALITET**

En lav vannskål eller en bromelie med vann i bladhjørnene er nok.

**LYS OG UVB**

*R. summersi* er dagaktiv, og lyset er først og fremst til plantene. Gi 12-14 timer lys om dagen og mørke om natten. Det er ikke dokumentert at arten trenger UVB.

**FÔRING**

Grunnfôret er små levende leddyr. Unger og unge dyr tar vingeløse bananfluer (*Drosophila melanogaster*), og store voksne kan også ta den større *D. hydei*.

**ATFERD OG HÅNDTERING**

*R. summersi* er dagaktiv, rask og ofte sky, men kan bli dristigere når den har vent seg til terrariet. Man ser mest til dem i et tett beplantet terrarium med gjemmesteder. Hannen roper fra et åpent sted med et mykt, summende rop.

**NATURLIG UTBREDELSE**

Peru.