herpy

PILGIFTFROSKER

Red Uakari Poison Frog

Ranitomeya uakarii

Ranitomeya uakarii er en svært liten, dagaktiv pilgiftfrosk på 13-16 mm fra Amazonas-bassenget. Den er svart med røde til oransje striper, gule flanker og blå bein, og den er sjelden i hobbyen. Stellet bygger på erfaringene med slekten, og arten passer for en øvet holder med tålmodighet og jevn tilgang på bittesmå fôrdyr.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Dendrobates uakarii*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**13-16 mm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-6 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetrollene bæres til vann**
Egglegging	**I bladkar (f.eks. bromeliaer)**
Egg per legging	**2-7**
Klekking	**10-14 dager**
Larvetid	**60-100 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Bærer rumpetrollene**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Et par eller en trio *Ranitomeya uakarii* trenger et terrarium på minst 45 × 45 × 45 cm. Målet er lånt fra slekten. Bruker du unge dyr, er det sikreste å starte med minst fire, så begge kjønn er med.

TEMPERATUR
Hold terrariet på 21-25 °C om dagen og 18-21 °C om natten. Tallene er lånt fra slekten. Ekstra varme er sjelden nødvendig i en oppvarmet stue. Sett aldri terrariet i direkte sollys, for overoppheting kan være dødelig.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten skal ligge på 70-100 %. Sprøyt daglig, slik at fuktigheten er nær 100 % morgen og kveld og 70-75 % midt på dagen. Da får terrariet tørke litt opp mellom sprøytingene.

VANN OG VANNKVALITET
En lav vannskål eller en bromelie med vann i bladhjørnene er nok. Hold vannet 1-2 cm dypt, slik at den lille frosken kan sitte i det med hode og overkropp over vannet; dybden er lånt fra slekten.

LYS OG UVB
Ranitomeya uakarii er dagaktiv, og lyset er først og fremst til plantene. Gi 12-14 timer lys om dagen med lysrør eller LED og mørke om natten. Det er ikke dokumentert at arten trenger UVB.

FÔRING
Grunnfôret er små leddyr: vingeløse bananfluer, spretthaler, små hvite bænkebitere og nyklekte siklader.

ATFERD OG HÅNDTERING
Ranitomeya uakarii er dagaktiv. I et tett beplantet terrarium med mange skjulesteder ser du som regel mer til froskene enn i et goldt terrarium, men de små froskene er ofte sjenerte og gjemmer seg når du kommer bort til glasset.

NATURLIG UTBREDELSE
Brasil, Colombia og Peru.