herpy

SALAMANDERE

Western Tiger Salamander

Ambystoma mavortium

Ambystoma mavortium er en kraftig salamander på opptil 30-35 cm fra prærier, skoger og halvørkener i Nord-Amerika, med gule tverrbånd og flekker på mørk bunn. Larvene lever i vann, mens de voksne tilbringer mesteparten av livet i selvgravde ganger og kommer frem om natten. Noen dyr forvandler seg aldri og blir kjønnsmodne med gjellene i behold.

Familie: Ambystomatidae **Mild hudgift**

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**15-30 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-20 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Halvørken og temperert skog og eng**
Hudgift	**Mild** Vask hendene etter kontakt, og hold fingrene unna øyne og munn
Vanskelighetsgrad	**Nybegynner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Larver i vann**
Egglegging	**I vann**
Kjønnsmoden	**5-36 mnd.**
Egg per sesong	**100-1 000**
Klekking	**19-50 dager**
Larvetid	**75-150 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Andre larver og små vanndyr (dafnier, mygglarver)**
Yngelpleie	**Ingen**

STELL

Min. terrarium	**50 × 25 × 30 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**18-22 °C**
Temperatur, natt	**16-20 °C**
Luftfuktighet	**80-95 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Ikke nødvendig**
Kosthold	**Insekter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller parvis**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Voksne dyr kan holdes i mange slags beholdere. Den enkleste er en stor plastkasse med tettsluttende lokk og mange små ventilasjonshull; et glassterrarium med nettinglokk gir bedre utsyn.
TEMPERATUR	Temperaturen skal ligge på 18-22 °C om dagen og gjerne litt lavere om natten, både for larver og voksne. Arten tåler kulde bedre enn varme. Larvebassenget varmes ikke opp, og vannet må ikke komme over 24 °C.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Underlaget skal være fuktig, men aldri vått eller gjørmete, for dyret tar opp vann gjennom huden og drikker ikke med munnen. Luftfuktigheten er ikke målt for arten; et fuktig underlag gir omtrent 80-95 %.
VANN OG VANNKVALITET	En lav, tung vannskål er ikke nødvendig, men den er en god sikkerhet: blir underlaget for tørt, søker dyret ned i skålen, så den forebygger dødsfall av uttørking.
LYS OG UVB	Arten er nattaktiv og trenger ikke noe spesielt lys. Det finnes ingen kunnskap om at den trenger UVB, og kraftig UV-lys kan skade øyne og hud hos amfibier.
FÔRING	Larver og neotene dyr spiser meitemark, kompostmark, passe store sirisser, voksmøllarver og små fisk. Små kjøttbiter kan gis som en enkelt middag, men ikke som hovedfôr, fordi kjøtt mangler vitaminer og mineraler.
ATFERD OG HÅNDTERING	Voksne dyr graver og ligger skjult det meste av dagen. De er nattaktive og aktive jegere som venter i bakhold. Mange dyr lærer å kjenne eieren sin og tigger mat. Arten er en einstøing utenom yngletiden og trives fint alene.
NATURLIG UTBREDELSE	Canada, USA og Mexico.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/salamandere/ambystoma-mavortium