herpy

SALAMANDERE

Japanese Fire-bellied Newt

Cynops pyrrhogaster

Cynops pyrrhogaster er en middels stor vannsalamander på 9-13 cm fra Japan med buet, brun til svart rygg og en rød til oransje buk med et brokket mønster av svarte flekker og streker. Den er hardfør og langlivet og tåler varmere vann enn de fleste salamandere, men trives best kjølig. De nyforvandlede ungene lever på land i opptil flere år, og det er den vanskeligste delen av oppdrettet.

Familie: Salamandridae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**9-13 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**20-30 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark og temperert skog og eng**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskap	**Ingen** Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Larver i vann**
Egglegging	**I vann**
Kjønnsmoden	**12-36 mnd.**
Egg per sesong	**100-400**
Klekking	**18-25 dager**
Larvetid	**90-180 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Små vanndyr (dafnier, mygglarver)**
Yngelpleie	**Ingen**

STELL

Min. terrarium	**75 × 35 × 35 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**15-21 °C**
Temperatur, natt	**12-18 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 20-30 cm
Vanntemperatur	**15-21 °C**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Nær truet (NT)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et par trenger et akvarium på minst 75 liter, for eksempel 75 × 35 × 35 cm. Flere dyr krever mer plass; til en gruppe på fem voksne passer omtrent 90 × 45 × 60 cm. Langt og lavt er bedre enn høyt, fordi dyrene utnytter bunnflaten.
TEMPERATUR	Vannet skal helst være 15-21 °C. Arten tåler varmere vann enn de fleste salamandere, men høy temperatur stresser dyrene og gjør dem mer mottakelige for infeksjoner.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Arten lever i og ved vann, så luftfuktigheten over vannet er ikke kritisk og er ikke målt for arten. Under et tett lokk er den høy, omtrent 70-90 %. Landområdet må være fuktig, slik at dyr som går på land, ikke tørker ut.
VANN OG VANNKVALITET	Vannstanden er minst 1,5 ganger lengden av det største dyret, i praksis 20-30 cm, og i større akvarier mer. Dyrene kan holdes i vann hele året når de har et landområde. Vannet må være rent, behandlet mot klor og 15-21 °C varmt.
LYS OG UVB	Arten er overveiende nattaktiv og krever ikke spesielt lys. Levende planter krever vanlig akvarielys.
FÔRING	Voksne dyr er enkle å fôre og tar mange slags fôr. Kosten bygger på hakkede meitemark, sortorm, hvitorm, opptinte røde mygglarver og artemia. De spiser også de fleste fôrinsekter.
ATFERD OG HÅNDTERING	Arten er langsom og rolig og kan holdes i par eller grupper når det er plass og mange skjul. Dyrene er aktive om kvelden og natten. Under fôring kan de snappe etter hverandre, så gi fôr flere steder.
NATURLIG UTBREDELSE	Japan.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/salamandere/cynops-pyrrhogaster