herpy

SALAMANDERE

Rough-skinned Newt

Taricha granulosa

Taricha granulosa er en 13-22 cm lang vannsalamander fra Nord-Amerikas stillehavskyst, med mørk, grynet rygg og skarpt oransje buk. Huden inneholder tetrodotoksin, en av de kraftigste giftene hos amfibier, og dyret er dødelig giftig hvis det svelges. Arten veksler mellom vann og land, kan holdes i vann hele året og må holdes kjølig.

Familie: Salamandridae Tidligere navn: *Salamandra granulosa; Triturus granulosus; Triturus similans* **Kraftig hudgift**

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**13-22 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**12-18 år**
Aktiv	**Om dagen og om natten**
Levevis	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark og temperert skog og eng**
Hudgift	**Kraftig** Unngå hudkontakt, og vask hendene grundig etter arbeid i terrariet
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 30 × 40 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-21 °C**
Temperatur, natt	**14-18 °C**
Luftfuktighet	**80-95 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 20-30 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Kosthold	**Insekter, ferdigfôr og mark/snegler**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Larver i vann**
Egglegging	**I vann**
Kjønnsmoden	**48-60 mnd.**
Egg per sesong	**7-30**
Klekking	**21-42 dager**
Larvetid	**60-150 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Små vanndyr (dafnier, mygglarver)**
Yngelpleie	**Ingen**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Taricha granulosa er den mest vannlevende arten i slekten. Dyrene veksler mellom land og vann, noen i måneder eller år av gangen, men fra omtrent ett års alder kan de holdes i vann hele året.

TEMPERATUR
Taricha granulosa er kjølelskende. Om sommeren holdes vann og luft på 18-21 °C. Blir det varmere, opp mot 24 °C, søker dyrene opp på land; lengre perioder over 21 °C bør unngås.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Landdelen og skjulestedene over vannet skal være fuktige, men ikke dyvåte. Luftfuktigheten er ikke målt for arten; et akvaterrarium med lokk og fuktige skjulesteder gir omtrent 80-95 %. God ventilasjon forebygger hudinfeksjoner.

VANN OG VANNKVALITET
Vannet skal være 20-30 cm dypt, og dypere vann skader ikke: det er nesten umulig å gi arten for dypt vann i et vanlig akvarium.

LYS OG UVB
Arten trenger ikke UVB. Vanlig dagslys i rommet eller et svakt lysstoffrør om dagen og mørke om natten er nok. Akvariet må ikke stå i direkte sol, og varmelamper må unngås.

FÔRING
Taricha granulosa er et opportunistisk rovdyr. I naturen spiser den tanglopper, insekter, snegler, igler, rumpetroll og egg fra amfibier og fisk.

ATFERD OG HÅNDTERING
Aktiviteten varierer: noen dyr er framme om dagen, andre gjemmer seg under røtter og steiner og jakter om natten. I yngletiden holder hannen fast rundt hunnen i paringsgrepet, som kan vare fra timer til flere dager.

NATURLIG UTBREDELSE
USA og Canada.