herpy

SALAMANDERE

Black Knobby Newt

Tylototriton asperrimus

Tylototriton asperrimus er en mørk, vortete krokodillesalamander på 12-15 cm med knoppete ribbeinspukler og kraftige ryggkammer. Arten lever i fuktige fjellområder i den kinesiske provinsen Guangxi og har gitt navn til en hel gruppe nærbeslektede krokodillesalamandere som først nylig er skilt ut som selvstendige arter.

Familie: Salamandridae Tidligere navn: *Echinotriton asperrimus; Pleurodeles asperrimus* **Mild hudgift**

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**12-15 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**15-25 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Fjellskog og våtmark**
Hudgift	**Mild** Vask hendene etter kontakt, og hold fingrene unna øyne og munn
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vann	**Vanndel** dybde 1-5 cm
UVB	**Valgfritt**
Vinterhvile	**8-12 °C** 8-12 uker
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Larver i vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per sesong	**30-80**
Klekking	**20-36 dager** ved 22-24 °C
Larvetid	**50-110 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Andre larver og små vanndyr (dafnier, mygglarver)**
Yngelpleie	**Ingen**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Nær truet (NT)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Tylototriton asperrimus*.
TEMPERATUR	Om sommeren holdes terrariet på 20-24 °C om dagen og 18-21 °C om natten, noe som svarer til sommeren i utbredelsesområdet.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten er 80-100 %. Terrariet sprøytes daglig med en blomstersprøyte, og det skal være både fuktigere og tørrere soner, så luften ikke blir stående.
VANN OG VANNKVALITET	Vanndelen skal ha mykt, svakt surt vann; regnvann eller osmosevann passer. Vannets pH er ikke dokumentert for *Tylototriton asperrimus*; *Tylototriton ziegleri* holdes ved pH 6,4-6,8. Bruk aldri springvann uten å fjerne klor.
LYS OG UVB	Lyset har ikke spesiell betydning for dyrene og rettes etter plantene: LED-bånd eller lysstoffrør i 12 timer om sommeren og 10-11 timer om vinteren. UVB er ikke nødvendig for den skjult-levende arten.
FÔRING	Voksne får bladorm, sirisser, husskrikkere, voksmøllarver, meitemark og skrukketroll i passende størrelse omkring to ganger i uken. Om vinteren spiser de uregelmessig og mye mindre.
ATFERD OG HÅNDTERING	Hos de nærbeslektede artene lever dyrene svært skjult og sees mest når det fôres, eller når hannene er i vannet. Par eller små grupper kan holdes sammen i et romslig terrarium med mange skjul.
NATURLIG UTBREDELSE	Kina.