herpy

SALAMANDERE

Guizhou Crocodile Newt

Tylototriton kweichowensis

Tylototriton kweichowensis er en kraftig, svartbrun krokodillesalamander på 15-21 cm med tre brede oransje til rødlige striper langs kroppen. Den lever på land i fjellene i Guizhou og Yunnan og går mest i vannet for å formere seg. Den holdes best i et stort terrarium med både land og vann.

Familie: Salamandridae Tidligere navn: *Pleurodeles kweichowensis* **Mild hudgift**

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**15-21 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-20 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Bakkelevende og semiakvatisk**
Biotop	**Fjellskog og våtmark**
Hudgift	**Mild** Vask hendene etter kontakt, og hold fingrene unna øyne og munn
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Larver i vann**
Egglegging	**På blader over vann**
Egg per sesong	**50-150**
Eggleggінger per år	**1**
Klekking	**10-12 dager** ved 25 °C
Larvetid	**80-100 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Små vanndyr (dafnier, mygglarver)**
Yngelpleie	**Ingen**

STELL

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-25 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 10-15 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	*Tylototriton kweichowensis* trenger et stort terrarium, fordi dyrene er store og tunge, trenger et solid landområde med et skjul til hvert dyr og må ha nok vann til både yngel og et filter.
TEMPERATUR	Arten trives ved vanlig romtemperatur: 18-25 °C om dagen og 15-20 °C om natten. Om sommeren kan dagen gjerne ligge i den høye enden, og om vinteren holdes dyrene på 15-20 °C døgnet rundt.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten må være høy, men bunnen ikke våt; 70-90 % er et anslag. Landdelen holdes fuktig uten å bli gjørmete, og en del av bunnen kan gjerne være tørrere.
VANN OG VANNKVALITET	Vanndelen fyller omtrent halvparten av terrariet. Dybden er ikke dokumentert for arten; 10-15 cm er lånt fra *Tylototriton verrucosus*. Bruk avklort springvann og et stille filter som ikke lager sterk strøm.
LYS OG UVB	UVB er ikke nødvendig, og arten er mest aktiv i skumringen og om natten. Lyset er til plantene, og daglengden kan gjerne følge årstidene, lengst om sommeren og kortere om vinteren, fordi den trolig er med på å styre hekketiden.
FÔRING	Voksne dyr får oppkuttede meitemark, sirisser og andre byttedyr av passende størrelse. Voksmøllarver og andre feite larver er populære, men skal ikke være grunnfôr.
ATFERD OG HÅNDTERING	Arten er treg og klumpete. 2-3 dyr kan holdes sammen når det er nok skjul til hvert dyr.
NATURLIG UTBREDELSE	Kina.