herpy

SALAMANDERE

Emperor Crocodile Newt

Tylototriton shanjing

Tylototriton shanjing er en kraftig, mørkebrun krokodillesalamander fra Yunnan i Sørvest-Kina med lysende oransje hode, ryggkam, kjertelvorter og hale. Den blir 12-20 cm, lever nesten hele året på land og går bare i vannet for å yngle. Dyret er rolig og hardført, men huden skiller ut et giftig sekret, så hendene må vaskes etter all kontakt.

Familie: Salamandridae **Mild hudgift**

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**12-20 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-20 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Bakkelevende og semiakvatisk**
Biotop	**Fjellskog**
Hudgift	**Mild** Vask hendene etter kontakt, og hold fingrene unna øyne og munn
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Larver i vann**
Egglegging	**I vann**
Kjønnsmoden	**24 mnd.**
Egg per sesong	**30-150**
Klekking	**10-12 dager** ved 22-25 °C
Larvetid	**90-150 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Andre larver og små vanndyr (dafnier, mygglarver)**
Yngelpleie	**Ingen**

STELL

Min. terrarium	**75 × 30 × 30 cm** L × B × H for 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-25 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Ikke nødvendig**
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	*Tylototriton shanjing* er en landsalamander som bare trenger vann i yngletiden. Fire voksne dyr kan holdes i et terrarium på 75 × 30 × 30 cm; gulvareal er viktigere enn høyde, og et par skal ha minst 60 × 30 cm.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen er 18-25 °C og nattemperaturen 15-20 °C. Om sommeren kan det gjerne bli 24-26 °C om dagen. Om vinteren holdes dyrene kjøligere, omkring 15-17 °C døgnet rundt, og på en tørrere bunn.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Arten foretrekker forholdsvis tørre forhold, tørrere enn andre landlevende krokodillesalamandere. 60-80 % luftfuktighet er et anslag. Sprøyt lett, så den våte enden av bunnen alltid er fuktig, og la den tørre enden være tørr.
VANN OG VANNKVALITET	Utenom yngletiden er vannet en lav skål med skrånende sider og avklort springvann, som skiftes jevnlig. I yngletiden skal det være en større vanndel på minst 30 × 30 cm (se «Parring»). Huden til amfibier er svært gjennomtrengelig.
LYS OG UVB	*Tylototriton shanjing* er skumrings- og nattaktiv og lever skjult, så den kommer sjelden fram mens lyset er tent. UVB er ikke nødvendig. Lyset er til plantene; en LED-pære som nesten ikke varmer, er nok.
FÔRING	Meitemark er det beste grunnfôret; store meitemark skjæres i passende biter. Små sirisser er et godt tillegg når de selv er godt fôret, og voksmøllarver og melormer kan gis som variasjon, men ikke som hovedføde.
ATFERD OG HÅNDTERING	Dyret er rolig og tregt og kan bli svært tamt: mange tigger om fôr ved ruta når de har vendt seg til holderen sin. Det er likevel ikke et dyr for daglig håndtering.
NATURLIG UTBREDELSE	Kina.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/salamandere/tylototriton-shanjing