herpy

SALAMANDERE

Himalayan Crocodile Newt

Tylototriton verrucosus

Tylototriton verrucosus er en stor, mørkebrun krokodillesalamander fra fjellene i det vestlige Yunnan, det nordlige Myanmar og tilgrensende områder. Den blir 13-24 cm og er den mest vannelskende av krokodillesalamanderne som holdes i terrarier: i den varme tiden av året blir den ofte helt i vannet, hvor den er aktiv og nysgjerrig.

Familie: Salamandridae Tidligere navn: *Pleurodeles verrucosus; Triturus verrucosus* **Mild hudgift**

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**13-24 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**12-18 g**
Levealder	**10-20 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Semiakvatisk**
Biotop	**Fjellskog og våtmark**
Hudgift	**Mild** Vask hendene etter kontakt, og hold fingrene unna øyne og munn
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Larver i vann**
Egglegging	**I vann**
Kjønnsmoden	**12-36 mnd.**
Egg per sesong	**30-200**
Klekking	**10-12 dager** ved 25 °C
Larvetid	**90-150 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Andre larver og små vanndyr (dafnier, mygglarver)**
Yngelpleie	**Ingen**

STELL

Min. terrarium	**60 × 30 × 35 cm** L × B × H for 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-25 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 12-15 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Kosthold	**Insekter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Nær truet (NT)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	*Tylototriton verrucosus* holdes best i et akvaterrarium. Over omkring 18 °C kan den mørke formen holdes helt i vann. Et akvarium på 60 × 30 × 35 cm passer til to par av den mørke formen og til færre dyr av de større formene.
TEMPERATUR	Om dagen skal temperaturen være 18-25 °C, med omtrent 25 °C om sommeren, og om natten 15-20 °C. Om vinteren holdes dyrene ved 15-18 °C. Den mørke formen tåler i noen dager både høyere og lavere temperaturer uten skade.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten er ikke avgjørende i et vannrikt oppsett; 70-90 % er et anslag. Der det er land, holdes landdelen fuktig, men ikke gjørmete. Sørg for at luften ikke blir stående.
VANN OG VANNKVALITET	Vanndybden er 12-15 cm. Skift 20-30 % av vannet hver andre uke, og oftere hvis det er mange fôrrester. Springvann behandles med vannbehandler mot klor, kloramin og tungmetaller før det brukes.
LYS OG UVB	Arten er skumrings- og nattaktiv, og UVB er ikke nødvendig. En daglengde på omkring 12 timer om sommeren er en god, men ikke nødvendig rytme, og lyset skal ellers bare passe til plantene. Unngå direkte sol.
FÔRING	Arten er ikke kresen, og store hunner kan spise forbløffende mye på kort tid.
ATFERD OG HÅNDTERING	I vannet er dyret aktivt og nysgjerrig og kan bli ganske tamt: det svømmer bort til ruta for å få mat og tar fôr fra pinsett og fingre. Det egner seg likevel ikke for daglig håndtering.
NATURLIG UTBREDELSE	Kina, Myanmar (Burma), India og Thailand.