herpy

SALAMANDERE

Ziegler's Crocodile Newt

Tylototriton ziegleri

Tylototriton ziegleri er en liten, nesten helt svart krokodillesalamander på 13-16 cm med tre rader av store vorter langs ryggen og klart røde fingre, tær og halens underside. Arten ble beskrevet i 2013, lever skjult i fjellskoger i det nordlige Vietnam og det sørlige Kina og er lett å holde i et terrarium med en liten vanndel.

Familie: Salamandridae Tidligere navn: *Yaotriton ziegleri* **Mild hudgift**

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**13-16 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**6-16 g**
Levealder	**15-25 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Fjellskog**
Hudgift	**Mild** Vask hendene etter kontakt, og hold fingrene unna øyne og munn
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-24 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vann	**Vanndel** dybde 1-5 cm
UVB	**Valgfritt**
Vinterhvile	**16-18 °C** 12-17 uker
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Larver i vann**
Egglegging	**På bakken**
Egg per sesong	**30-80**
Klekking	**20-36 dager** ved 20-24 °C
Larvetid	**50-110 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Andre larver og små vanndyr (dafnier, mygglarver)**
Yngelpleie	**Ingen**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Tylototriton ziegleri holdes i et regnskogsterrarium med en liten vanndel. Tre voksne dyr trenger et terrarium på minst 60 × 40 × 40 cm.

TEMPERATUR
Fra mars til oktober holdes terrariet på 22-24 °C om dagen og 20-22 °C om natten. Høyere temperaturer tåler dyrene en kort tid, men lengre perioder over omtrent 25 °C bør unngås, og det må være kjølige steder i terrariet.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten er 80-100 %. Terrariet sprøytes daglig med en blomstersprøyte eller et regnanlegg, og mengden avpasses etter terrariets størrelse og ventilasjon, så bunnen ikke blir stillestående våt.

VANN OG VANNKVALITET
Vanndelen skal ha mykt, svakt surt vann med pH 6,4-6,8; for eksempel regnvann som har stått en stund. Vannet er høyst 5 cm dypt. Bruk aldri springvann uten å fjerne klor.

LYS OG UVB
Lyset har ikke spesiell betydning for dyrene, som ikke liker sterkt lys. Det rettes etter plantene: LED-bånd eller lysstoffrør i 12 timer om sommeren og 10-11 timer om vinteren. Indirekte romlys er også nok.

FÔRING
Voksne dyr får fôr som er vanlig for salamandere: bladorm, sirisser, husskrikkere, voksmøllarver, meitemark og skrukketroll i passende størrelse.

ATFERD OG HÅNDTERING
Dyrene er skjulte og stille og sees mest når det fôres, eller når hannene er i vannet. Aggresjonen mellom voksne er vanligvis ikke noe problem, og par eller små grupper kan holdes sammen hvis terrariet er stort nok.

NATURLIG UTBREDELSE
Vietnam og Kina.