herpy

SALAMANDERE

Småsalamander

Lissotriton vulgaris

Lissotriton vulgaris er en liten, tilpasningsdyktig vannsalamander på 8-11 cm som lever mesteparten av året på land og bare går i vannet for å yngle. Om våren får hannen en bølget ryggkam og sterke farger. Arten er hardfør i et kjølig akvaterrarium med vinterdvale, og den legger gjerne egg, slik at hele livsløpet kan følges.

Familie: Salamandridae Engelsk: Smooth Newt Tidligere navn: *Triturus vulgaris* Publisert 16. november 2026 **Mild hudgift**

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**8-11 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**0,3-5,2 g**
Levealder	**4-14 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark og temperert skog og eng**
Hudgift	**Mild** Vask hendene etter kontakt, og hold fingrene unna øyne og munn
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H for 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**12-20 °C**
Temperatur, natt	**8-15 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 10-20 cm
Vanntemperatur	**10-20 °C**
UVB	**Ikke nødvendig**
Vinterhvile	**5-10 °C** 8-12 uker
Kosthold	**Insekter, små leddyr (spretthaler, bananfluer) og mark/snegler**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Larver i vann**
Egglegging	**I vann**
Kjønnsmoden	**24-36 mnd.**
Egg per sesong	**100-500**
Klekking	**8-35 dager**
Larvetid	**42-120 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Små vanndyr (dafnier, mygglarver)**
Yngelpleie	**Ingen**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Voksne dyr må ha både en vann- og en landdel. Et akvaterrarium på 60 × 30 × 30 cm passer til opptil 4 voksne dyr, og større er bedre: mer vannflate gir dyrene plass i yngletiden.

TEMPERATUR
Lissotriton vulgaris er kjøligelskende. Dagtemperaturen er 12-20 °C og nattemperaturen 8-15 °C. Rundt 20 °C er det høyeste dyrene bør ha over lengre tid, og de er aktive helt ned til omtrent 5 °C.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Den myke huden tørker raskt ut, så landdelen må holdes fuktig, med en luftfuktighet på 80-100 %. Sprøyt landdelen med avklorert vann en til to ganger daglig, og la jord og mose holde på fuktigheten uten at bunnen blir sumpet.

VANN OG VANNKVALITET
Vanndelen må være 10-20 cm dyp og 10-20 °C. Bruk avklorert springvann, springvann som har stått noen dager, eller regnvann; arten er ikke kresen med pH, men klor er skadelig.

LYS OG UVB
UVB er ikke nødvendig for arten, som lever skjult og er aktiv i skumringen og om natten. Dyrene unngår sol. Vanlig LED-lys i 10-12 timer om dagen gir vannplantene det de trenger, og mer lys om våren hjelper dyrene i yngleform.

FÔRING
Lissotriton vulgaris spiser alle små dyr den kan svelge. På land får voksne dyr små meitemarker, små nakensnegler, skrukketroll, hvite ormer, bladlus, bananfluer og små siriss.

ATFERD OG HÅNDTERING
Arten er fredelig og kan holdes i par eller i grupper med flere hunner enn hanner. I yngletiden forfølger hannene hunnene, så flere hunner enn hanner, mange planter og gode skjul gir ro.

NATURLIG UTBREDELSE
Irland, Storbritannia, Frankrike, Belgia, Nederland, Luxemburg, Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Østerrike, Sveits, Italia, Slovenia, Kroatia, Ungarn, Romania, Bulgaria, Serbia, Ukraina, Hviterussland, Moldova, Russland og Kasakhstan.