herpy

SALAMANDERE

Paramesotriton caudopunctatus

Paramesotriton caudopunctatus er en kraftig, nesten helt vannlevende salamander på opptil 16 cm fra fjellskogene i det sørlige sentrale Kina. Artsnavnet henviser til de små flekkene på halen. Arten vokser uvanlig langsomt, er sjelden i fangenskap og trenger kjølig, rent vann.

Familie: Salamandridae Engelsk: Guizhou Warty Newt Publisert 16. november 2026 **Mild hudgift**

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**13-16 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Akvatisk**
Biotop	**Regnskog, fjellskog og våtmark**
Hudgift	**Mild** Vask hendene etter kontakt, og hold fingrene unna øyne og munn
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Larver i vann**
Egglegging	**I vann**
Kjønnsmoden	**108-120 mnd.**
Egg per sesong	**20-115**
Eggleggінger per år	**1**
Klekking	**21-56 dager** ved 18-25 °C
Larvetid	**80-110 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Andre larver og små vanndyr (dafnier, mygglarver)**
Yngelpleie	**Ingen**

STELL

Min. terrarium	**60 × 30 × 35 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**16-22 °C**
Temperatur, natt	**14-18 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 15-20 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Parvis**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Nær truet (NT)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Paramesotriton caudopunctatus*, og arten er sjelden i fangenskap.
TEMPERATUR	*Paramesotriton caudopunctatus* må holdes kjølig: 16-22 °C om dagen og 14-18 °C om natten, og vannet må ikke bli varmere enn 22 °C.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	*Paramesotriton caudopunctatus* er nesten helt vannlevende, så luftfuktigheten spiller liten rolle; 70-90 % er fint. En landdel må være fuktig så lenge dyrene bruker den.
VANN OG VANNKVALITET	Vannet skal være 15-20 cm dypt. Bruk avklort springvann eller kildevann. Vannet skal være rent, og ekstreme verdier av pH og hardhet unngås. Et svampfilter eller et lite innvendig filter med svak strøm passer.
LYS OG UVB	*Paramesotriton caudopunctatus* trenger ikke kraftig lys. Et enkelt lysstoffrør eller LED-rør på en tidsbryter gir en fast døgnrytme på omkring 12 timer. UVB er ikke nødvendig.
FÔRING	*Paramesotriton caudopunctatus* spiser det samme som resten av slekten: hakkede meitemarker, sirisser, nyskallede melorm, kakerlakker og biter av reker. Voksne fôres to ganger i uken, unge 3-4 ganger i uken.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Paramesotriton caudopunctatus* er mer aktiv enn de fleste artene i slekten. Unge landdyr er derimot svært skjulte og sees sjelden.
NATURLIG UTBREDELSE	Kina.