herpy

SALAMANDERE

Paramesotriton hongkongensis

Paramesotriton hongkongensis er en robust, nesten helt vannlevende salamander på 11-16 cm fra skogbekkene i Hongkong og det kystnære Guangdong. Den er brun med store oransje til røde flekker på buken og et hardført, kjølighetselskende akvariedyr som vokser langsomt og trenger kjølig, rent vann.

Familie: Salamandridae Engelsk: Hong Kong Warty Newt Publisert 16. november 2026 **Mild hudgift**

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**11-16 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Akvatisk**
Biotop	**Regnskog og våtmark**
Hudgift	**Mild** Vask hendene etter kontakt, og hold fingrene unna øyne og munn
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 30 × 35 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-22 °C**
Temperatur, natt	**16-20 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 15-20 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Vinterhvile	**8-12 °C** 2-6 uker
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Larver i vann**
Egglegging	**I vann**
Kjønnsmoden	**24-60 mnd.**
Egg per sesong	**20-115**
Eggleggінger per år	**1**
Klekking	**21-56 dager** ved 18-25 °C
Larvetid	**80-110 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Andre larver og små vanndyr (dafnier, mygglarver)**
Yngelpleie	**Ingen**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Nær truet (NT)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Paramesotriton hongkongensis holdes i et akvarium på minst 60 × 30 × 35 cm (omkring 60 liter) til et par. Hannene kan være territorielle, men mindre enn hos andre arter i slekten, og hunnene kan være aggressive ved fôring.

TEMPERATUR

Paramesotriton hongkongensis skal holdes kjølig: 18-22 °C om dagen og 16-20 °C om natten, og vannet må ikke komme over 22 °C. Varme rom om sommeren krever kjøling med vifte, kjøleelementer eller plassering i et kjølig rom.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Paramesotriton hongkongensis er vannlevende, så luftfuktigheten spiller en liten rolle; omkring 70-90 % i rommet er fint. En korkøy eller landdel skal holdes fuktig hvis dyrene bruker den.

VANN OG VANNKVALITET

Vannet skal være cirka 15-20 cm dypt. Bruk avklort vann fra springen eller kildevann. *Paramesotriton hongkongensis* er ikke kresen med vannverdiene så lenge vannet er rent, og ekstreme verdier av pH og hardhet unngås.

LYS OG UVB

Paramesotriton hongkongensis trenger ikke sterkt lys. Et enkelt lysstoffrør eller LED-rør i akvariets lengde på en timer gir en fast døgnrytme på cirka 12 timer og er nok for plantene. UVB er ikke nødvendig.

FÔRING

Paramesotriton hongkongensis spiser det meste: hakkede meitemark, sirisser, voksmøllarver, nyskallede melormer, kakerlakker, snegler, fluelarver og biter av reker samt ferdigfôr til amfibier og vannskilpadder.

ATFERD OG HÅNDTERING

Paramesotriton hongkongensis er sky i begynnelsen, men dyrene blir ofte tillitsfulle og svømmer fram mot fronten når det er mat. Hannene kan være stridbare overfor hverandre, særlig i yngletiden, og hunnene kan slåss om fôret.

NATURLIG UTBREDELSE

Hongkong SAR Kina og Kina.