herpy

SALAMANDERE

Tylototriton kweichowensis

Tylototriton kweichowensis er en kraftig, svartbrun krokodillesalamander på 15-21 cm med tre brede oransje til rødlige striper langs kroppen. Den lever på land i fjellene i Guizhou og Yunnan og går mest i vannet for å formere seg. Den holdes best i et stort terrarium med både land og vann.

Familie: Salamandridae Engelsk: Guizhou Crocodile Newt Tidligere navn: *Pleurodeles kweichowensis* Publisert 16. november 2026

Mild hudgift

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**15-21 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-20 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Bakkelevende og semiakvatisk**
Biotop	**Fjellskog og våtmark**
Hudgift	**Mild** Vask hendene etter kontakt, og hold fingrene unna øyne og munn
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-25 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 10-15 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Larver i vann**
Egglegging	**På blader over vann**
Egg per sesong	**50-150**
Eggleggінger per år	**1**
Klekking	**10-12 dager** ved 25 °C
Larvetid	**80-100 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Små vanndyr (dafnier, mygglarver)**
Yngelpleie	**Ingen**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Tylototriton kweichowensis trenger et stort terrarium, fordi dyrene er store og tunge, trenger et solid landområde med et skjul til hvert dyr og må ha nok vann til både yngel og et filter.

TEMPERATUR

Arten trives ved vanlig romtemperatur: 23-26 °C om sommeren og 15-20 °C om vinteren. Boksens dagtemperatur er 18-25 °C og nattemperaturen 15-20 °C. Varmere enn rundt 26 °C bør det ikke bli over lengre tid.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten må være høy, men bunnen ikke våt; 70-90 % er et anslag. Landdelen holdes fuktig uten å bli gjørmete, og en del av bunnen kan gjerne være tørrere.

VANN OG VANNKVALITET

Vanndelen fyller omtrent halvparten av terrariet. Dybden er ikke dokumentert for arten; 10-15 cm er lånt fra *Tylototriton verrucosus*. Bruk avklort springvann og et stille filter som ikke lager sterk strøm.

LYS OG UVB

UVB er ikke nødvendig, og arten er mest aktiv i skumringen og om natten. Lyset er til plantene, og daglengden kan gjerne følge årstidene, lengst om sommeren og kortere om vinteren, fordi den trolig er med på å styre hekketiden.

FÔRING

Voksne dyr får oppkuttede meitemark, sirisser og andre byttedyr av passende størrelse. Voksmøllarver og andre feite larver er populære, men skal ikke være grunnfôr.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten er treg og klumpete. 2-3 dyr kan holdes sammen når det er nok skjul til hvert dyr.

NATURLIG UTBREDELSE

Kina.