herpy

SALAMANDERE

Tylototriton vietnamensis

Tylototriton vietnamensis er en liten, mørk krokodillesalamander på 12-17 cm fra noen få skogrester i det nordlige Vietnam. Dyret er svart til brungrått, med klart gule til oransjerøde fingre, tær og halebunn, og lever mest på land. Arten ble først beskrevet i 2005 og er sårbar i naturen.

Familie: Salamandridae Engelsk: Vietnam Crocodile Newt Publisert 16. november 2026 **Mild hudgift**

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**12-17 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**7-18 g**
Levealder	**10-20 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift	**Mild** Vask hendene etter kontakt, og hold fingrene unna øyne og munn
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**23-25 °C**
Temperatur, natt	**23-25 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vanndel** dybde 1-5 cm
UVB	**Ikke nødvendig**
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Larver i vann**
Egglegging	**På bakken**
Kjønnsmoden	**18 mnd.**
Egg per sesong	**5-178**
Eggleggінger per år	**1-2**
Klekking	**28 dager** ved 22-24 °C
Larvetid	**60-180 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Små vanndyr (dafnier, mygglarver)**
Yngelpleie	**Ingen**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Tylototriton vietnamensis holdes i et regnskogsterrarium med en vanndel. Plassbehovet regnes ut fra dyrenes lengde: for to dyr på 15 cm skal bunnarealet være omkring 0,15 m² (50 × 30 cm), og for hvert ekstra dyr legges 25 % til.

TEMPERATUR
Fra mars til oktober holdes terrariet ved 23-25 °C. En egen nattetemperatur er ikke dokumentert, så boksen viser samme intervall døgnet rundt. Korte topper over 30 °C tåles, men det skal alltid være kjøligere steder i terrariet.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten er 70-100 % i den varme delen av året. Terrariet sprøytes daglig med en blomstersprøyte eller et regnanlegg; mengden avhenger av terrariets størrelse og ventilasjon.

VANN OG VANNKVALITET
Vanddelen er 1-5 cm dyp og fyller en fjerdedel av bunnarealet. Vannet er mykt og svakt surt (pH 6,4-6,8) som i naturen. Gi alltid et lett utgangssted med stein, grus eller en flat bredd.

LYS OG UVB
Lyset har ingen spesiell betydning for dyrene, og de liker ikke sterkt lys. Belysningen kan rettes etter plantene, med LED-lister eller lysstoffrør, eller bare det lyset som faller inn i rommet. UVB er ikke nødvendig.

FÔRING
Voksne dyr får meitemark, sirisser og voksorm, og fôrdyrene fôres selv med en variert kost og drysses med vitamin- og mineraltilskudd. Voksne dyr fôres omkring to ganger i uken; om vinteren spiser de uregelmessig og mye mindre.

ATFERD OG HÅNDTERING
Dyrene søker skjul og liker ikke skarpt lys. Hannene går ned i vannet i yngletiden, blir lysere og får en tydelig annerledes hud, og de venter på hunnene. Resten av året lever begge kjønn på land.

NATURLIG UTBREDELSE
Vietnam.