herpy

SALAMANDERE

# *Tylototriton wenxianensis*

*Tylototriton wenxianensis* er en mellomstor, nesten helt svart krokodillesalamander med oransje tåspisser og halekant. Den lever skjult i skog og kratt i fjellene i det sentrale Kina og går bare i vannet for å yngle; eggene legges på land. Det finnes bare lite kunnskap om stell, så veiledningen bygger på nære slektninger.

Familie: Salamandridae  Engelsk: Wenxian Knobby Newt  Publisert 16. november 2026  **Mild hudgift**

## FAKTABOKS

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **13-16 cm**<br>total lengde inkl. hale |
| Levealder | **10-20 år** |
| Aktiv | **I skumringen og om natten** |
| Levevis | **Bakkelevende og semiakvatisk** |
| Biotop | **Fjellskog og våtmark** |
| Hudgift | **Mild**<br>Vask hendene etter kontakt, og hold fingrene unna øyne og munn |
| Vanskelighetsgrad | **Erfaren** |

### STELL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **60 × 40 × 40 cm**<br>L × B × H for 3 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **18-24 °C** |
| Temperatur, natt | **15-20 °C** |
| Luftfuktighet | **70-90 %** |
| Vann | **Vanndel**<br>dybde 3-5 cm |
| UVB | **Ikke nødvendig** |
| Kosthold | **Insekter og mark/snegler** |
| Holdes | **Parvis eller i gruppe** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Eggleggende** |
| Utvikling | **Larver i vann** |
| Egglegging | **På bakken** |
| Egg per sesong | **30-80** |
| Klekking | **20-36 dager**<br>ved 22-24 °C |
| Larvetid | **80-130 dager**<br>fra klekking til metamorfose |
| Larvefôr | **Andre larver og små vanndyr (dafnier, mygglarver)** |
| Yngelpleie | **Ingen** |

### VERN OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Liste II** |
| EU-vedlegg | **Vedlegg B** |
| IUCN | **Sårbar (VU)** |

## Stell i korte trekk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Tylototriton wenxianensis*. |
| **TEMPERATUR** | Om sommeren holdes terrariet på 22-24 °C, om vinteren omkring 18 °C, og kortvarig lavere temperaturer skader ikke; slik holdes *T. ziegleri*. |
| **LUFTFUKTIGHET OG DUSJING** | Om sommeren sprøytes terrariet daglig, så mose og bunn holdes fuktige; 70-90 % luftfuktighet er et anslag. |
| **VANN OG VANNKVALITET** | Vannet er mykt og lett surt, pH 6,4-6,8, og høyst omkring 5 cm dypt. Utenom yngletiden bruker dyrene nesten ikke vanndelen; om vinteren kan den nesten tørrlegges, så det bare er litt vann igjen til fuktigheten. |
| **LYS OG UVB** | UVB er ikke nødvendig. Arten lever skjult og liker ikke sterkt lys; lyset er først og fremst til plantene. Gi omkring 12 timers lys om sommeren og 10-11 timer om vinteren. Unngå direkte sol, som varmer opp terrariet og vannet. |
| **FÔRING** | Føden er ikke dokumentert for arten. Slekten tar vanlig salamanderfôr: meitemark, sirisser, skrukketroll og voksmøllarver. Voksne dyr fôres omkring to ganger i uken, og om vinteren spiser de uregelmessig og mye mindre. |
| **ATFERD OG HÅNDTERING** | Atferden i fangenskap er ikke dokumentert for arten. Hos *T. ziegleri* lever dyrene svært skjult, og de kan holdes alene, i par eller i små grupper. Hold arten for seg selv uten andre amfibier. |
| **NATURLIG UTBREDELSE** | Kina. |