herpy

SKILPADDER

Chelonoidis denticulatus

Chelonoidis denticulatus er en stor, mørk skogskilpadde fra Amazonas og de tilstøtende skogene med gule til oransje skjell på hode og bein. Skjoldet er vanligvis 35-45 cm langt, og i noen bestander blir dyrene 60-70 cm. Arten kan leve i mer enn 50 år, krever jevn varme og høy luftfuktighet hele året og spiser blader, frukt og litt animalsk føde.

Familie: Testudinidae Engelsk: Yellow-Footed Tortoise Tidligere navn: *Chelonoidis denticulata; Geochelone denticulata; Testudo denticulata; Testudo tabulata* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**35-70 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**50-60 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Tørrskog og regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**320 × 160 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-29 °C**
Varmeplass	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter, frukt, planter og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**96-120 mnd.**
Kullstørrelse	**2-7 egg**
Inkubasjon	**120-190 dager** ved 29-31 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Chelonoidis denticulatus stelles i store trekk som den nære slektningen *Chelonoidis carbonarius*, men er en mer utpreget skogart som krever mer skygge, mer stabil varme og en jevnt høy luftfuktighet.

TEMPERATUR

Lufttemperaturen er 26-29 °C om dagen, og solplassen under varmelampen er 29-32 °C, målt på selve underlaget. Den kjøligere enden er 24-26 °C. Om natten kan temperaturen falle til 20-23 °C, men aldri under 18 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten er ikke målt for arten; 70-90 % er lånt fra *C. carbonarius* og passer for en fuktig skogart. Substratet må være jevnt fuktig uten å stå i vann.

LYS OG UVB

C. denticulatus er dagaktiv, men en skyggeelskende skogart som ikke soler seg i skarpt lys som ørkenarter. UVB er likevel nødvendig: mål UV-indeksen 2,0-3,0 på solplassen (Ferguson-sone 2).

FÔRING

C. denticulatus er altetende. I naturen spiser den blader, gress, blomster, nedfalne frukter, sopp, åtsler og langsomme smådyr. Frukt fyller litt mer i kosten enn hos *C. carbonarius*, men grunnlaget er fortsatt blader.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten er rolig og nysgjerrig, men ofte litt mer tilbakeholden enn *C. carbonarius*, og den oppholder seg helst tett på dekning. Mange dyr blir likevel tillitsfulle og kommer frem når det er mat.

NATURLIG UTBREDELSE

Venezuela, Guyana, Surinam, Fransk Guyana, Brasil, Ecuador, Colombia, Peru, Bolivia og Trinidad og Tobago.