herpy

SKILPADDER

Chelydra serpentina

Chelydra serpentina er en stor, nesten helt vannlevende skilpadde fra det østlige Nord-Amerika med kraftige kjever og lang hale. Skjoldet blir vanligvis 25-45 cm, dyret veier 5-16 kg, og det kan leve i mange tiår. Arten krever et svært stort, filtrert kar med bar bunn, passer ikke til håndtering og blir lett overvektig.

Familie: Chelydridae Engelsk: Common Snapping Turtle Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**25-45 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**4 500-16 000 g**
Levealder	**30-50 år**
Aktiv	**Om dagen og om natten**
Levevis	**Akvatisk**
Biotop	**Våtmark og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**200 × 100 × 70 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Varmeplass	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 25-40 cm
Vanntemperatur	**23-27 °C**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Vinterhvile	**4-6 °C** 8-12 uker
Kosthold	**Insekter, ferdigfôr, planter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**84-240 mnd.**
Kullstørrelse	**25-80 egg**
Kull per år	**1**
Inkubasjon	**63-140 dager** ved 20-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Hold dyret i et stort kar, et fôrkar av plast eller en dam, ikke i et vanlig terrarium.
TEMPERATUR	Vannet må være 23-27 °C. Under ca. 21 °C mister dyret appetitten og fordøyer dårlig, og over omtrent 29 °C stresses det og blir mer aggressivt, og bakteriene i vannet formerer seg raskere.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Skilpaddens fuktighet er vannet selv, så luftens relative fuktighet er ikke avgjørende og ikke nærmere dokumentert for arten; 50-80 % i rommet er rikelig. Det avgjørende er vannets renhet.
VANN OG VANNKVALITET	Vannet er dyrets oppholdssted, så det må være dypt nok, rent og varmt. Voksne dyr trives i 25-40 cm vann. Temperaturen er 23-27 °C. Filtreringen er den viktigste delen av utstyret og må være dimensjonert til 2-3 ganger vannmengden.
LYS OG UVB	UVB er anbefalt, men mindre avgjørende enn hos vannskilpadder som soler seg mye, fordi dyret får D3 gjennom hele byttedyr. Ferguson-sonen er ikke dokumentert for arten; sone 2 er et anslag ut fra at arten soler seg sjelden.
FÔRING	*C. serpentina* er altetende og spiser i naturen smådyr, fisk, frosker, amfibier, krepsdyr, snegler, ormer, krypdyr, åtsler og store mengder vannplanter.
ATFERD OG HÅNDTERING	*C. serpentina* er defensiv og biter raskt og hardt når den tas opp eller føler seg truet; et bitt kan gi dype sår. Halsen er lang og bevegelig, så dyret kan nå bakover over skjoldet.
NATURLIG UTBREDELSE	USA og Canada.