herpy

SKILPADDER

Chrysemys picta

Chrysemys picta er en dagaktiv, halvt vannlevende skilpadde fra Nord-Amerika med røde og gule striper på hals, ben og skjoldkant. Skjoldet blir 13-25 cm, og dyret kan leve i mange tiår. Et voksent dyr trenger et stort, filtrert kar med flere hundre liter vann, en varm solplass og kraftig UVB.

Familie: Emydidae Engelsk: Painted Turtle Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**13-25 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**300-500 g**
Levealder	**25-40 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**170 × 70 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-30 °C**
Varmeplass	**30-40 °C**
Temperatur, natt	**15-24 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 25-35 cm
Vanntemperatur	**21-27 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter, ferdigfôr, planter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**4-15 egg**
Kull per år	**1-5**
Inkubasjon	**72-80 dager** ved 25-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Hold dyret i et akvarium, et stort kar eller en lukket innendørs dam, ikke i et vanlig terrarium.
TEMPERATUR	Overflaten på solplassen skal være omtrent 40 °C, målt med et infrarødt termometer et par timer etter at lampene er slått på, og luften over solplassen 30-35 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Skilpaddens fuktighet er selve vannet, så luftens relative fuktighet er ikke nærmere dokumentert for arten og er ikke avgjørende; 50-80 % i rommet er rikelig. Det avgjørende er vannets renhet.
VANN OG VANNKVALITET	Vannet er dyrets oppholdssted, så det må være dypt, rent og varmt. Vanndybden må minst tilsvare skjoldlengden, og 25-35 cm passer for voksne dyr. Temperaturen er 24-27 °C (se Temperatur).
LYS OG UVB	UVB er en nødvendighet. Arten hører til Ferguson-sone 3-4. UV-indeksen på overflaten av solplassen skal være omtrent 3,0-4,0, og det kan gjerne være områder med lavere UV-indeks, slik at dyret kan velge.
FÔRING	*C. picta* er altetende. I naturen spiser den vannplanter, alger, vanninsekter, krepsdyr, snegler, små fisker og åtsler. De unge dyrene er mest kjøttetende, og med alderen blir kosten mer plantebasert.
ATFERD OG HÅNDTERING	*C. picta* er dagaktiv, sky og rask til å flykte ned i vannet. Den er ikke temmet og trives ikke med kontakt, så den skal bare håndteres når det er nødvendig, for eksempel ved helsesjekk eller rengjøring.
NATURLIG UTBREDELSE	Canada, USA og Mexico.