herpy

SKILPADDER

Emys orbicularis

Emys orbicularis er en dagaktiv, halvt vannlevende ferskvannsskilpadde fra det sørlige, sentrale og østlige Europa, Nord-Afrika og Vest-Asia. Skjoldet blir typisk 15-20 cm, og dyret kan leve i mange tiår. Arten stelles best i en stor, solrik og rømningssikker hagedam, der den også kan overvintre, og den krever sol eller UVB, varme om sommeren og en kald vinterhvile.

Familie: Emydidae Engelsk: European Pond Turtle Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**12-23 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**400-700 g**
Levealder	**30-100 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**170 × 75 × 75 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Varmeplass	**35 °C**
Temperatur, natt	**18-20 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 40-60 cm
Vanntemperatur	**24-28 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Vinterhvile	**4-6 °C** 8-16 uker
Kosthold	**Insekter, ferdigfôr, planter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**48-216 mnd.**
Kullstørrelse	**3-20 egg**
Kull per år	**1-2**
Inkubasjon	**60-120 dager** ved 26-31 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste III**
EU-vedlegg	**Vedlegg C**
IUCN	**Nær truet (NT)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Voksne *Emys orbicularis* stelles best utendørs i en lukket hagedam med sol, planter og bløtt bunnsubstrat.

TEMPERATUR
I en utendørs dam følger temperaturen årstiden, og dyrene regulerer selv varmen sin ved å sole seg. Dammen skal ligge solrikt og i le.

LUFTFUKTIGHET OG VANN
Luftfuktigheten er ikke avgjørende for en vannskilpadde, og 50-80 % i rommet er rikelig. Det avgjørende er vannets renhet. Dyret avgir avføringen i vannet, og vannet blir raskt skittent i et akvaterrarium.

VANN OG VANNKVALITET
Vannet er dyrets oppholdssted, så det skal være dypt, rent og fylt med skjul. Innendørs passer 40-60 cm vann og 24-28 °C.

LYS OG UVB
Utendørs får dyret solens egen UVB når det ikke er glass eller tett nett imellom, og solplassene skal ligge i full sol det meste av dagen. Innendørs er UVB nødvendig.

FÔRING
Emys orbicularis er altetende med hovedvekt på smådyr. I naturen spiser den insekter og larvene deres, særlig øyenstikkernymfer, snegler, krepsdyr, ormer, rumpetroll og døde fisk, men også vannplanter.

ATFERD OG HÅNDTERING
E. orbicularis er dagaktiv og i naturen sky og forsiktig. I fangenskap blir den raskt vant til stelleren sin og kommer bort til fôringsstedet, men den liker ikke å bli håndtert.

NATURLIG UTBREDELSE
Marokko, Algerie, Tunisia, Portugal, Spania, Frankrike, Italia, Tyskland, Østerrike, Polen, Ungarn, Slovakia, Romania, Bulgaria, Kroatia, Slovenia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Montenegro, Nord-Makedonia, Albania, Hellas, Tyrkia, Ukraina, Moldova, Hviterussland, Litauen, Latvia, Russland, Kasakhstan, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Iran og Turkmenistan.