herpy

SKILPADDER

Kinixys belliana

Kinixys belliana er en mellomstor afrikansk landskilpadde med et avlangt skjold og et bevegelig hengsel bakover, som kan lukke skjoldet over bakbein og hale. Skjoldet er 15-22 cm langt. Arten lever i savanne med tydelig regntid og tørketid, krever stabil varme og en viss fuktighet og stresser lett. Nyinnførte dyr bærer ofte mange parasitter.

Familie: Testudinidae Engelsk: Bell's Hinge-back Tortoise Tidligere navn: *Cinixys belliana; Kinixys schoensis* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**15-22 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**30-50 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Savanne**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**160 × 80 × 40 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**28-32 °C**
Varmeplass	**32-35 °C**
Temperatur, natt	**22-24 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter, frukt, planter og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1-6 egg**
Kull per år	**1-2**
Inkubasjon	**105-200 dager** ved 28-31 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Ikke vurdert (NE)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite sikker viten om stellet av *Kinixys belliana*, fordi mye av den eldre viten stammer fra tiden da flere arter ble regnet som én.

TEMPERATUR

Dyret skal holdes varmt, over 29 °C mesteparten av tiden. Dagtemperaturen er 28-32 °C, og solplassen er 32-35 °C, målt på underlaget. Nattetemperaturen er ikke dokumentert for arten; 22-24 °C passer til et tropisk klima.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Som savanneart er *K. belliana* mindre fuktighetskrevende enn skogartene *Kinixys homeana* og *Kinixys erosa*, men den holder av fuktighet og skal sprøytes jevnlig.

LYS OG UVB

K. belliana er dagaktiv, men mest fremme tidlig og sent på dagen når lyset er svakt. Sollys er det beste, men i Danmark er UVB-lys nødvendig: UV-indeks 2,0-3,0 på solplassen (Ferguson-sone 2).

FÔRING

K. belliana er altetende, og unger er nesten utelukkende kjøttetere.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten er sky og trekker seg inn i skjoldet eller graver seg ned når den blir forstyrret. Den er mest aktiv tidlig om morgenen og sent på dagen.

NATURLIG UTBREDELSE

Angola, Burundi, Den sentralafrikanske republikk, Kongo, Eritrea, Etiopia, Kenya, Rwanda, Somalia, Sør-Sudan, Sudan, Uganda, Tanzania og Malawi.