herpy

SKILPADDER

Mauremys rivulata

Mauremys rivulata er en middels stor, dagaktiv ferskvannsskilpadde fra Balkan og det østlige Middelhavsområdet. Hunnene når omtrent 24 cm skjoldlengde, hannene omtrent 19 cm. Arten er hardfør og tåler mange slags vann, men krever et stort, filtrert akvaterrarium med en varm solplass og UVB. Om sommeren kan den holdes utendørs i en lukket dam.

Familie: Geoemydidae Engelsk: Balkan Terrapin Tidligere navn: *Mauremys caspica rivulata; Emys rivulata* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**15-24 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**20-30 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**170 × 70 × 65 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Varmeplass	**30-35 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 25-40 cm
Vanntemperatur	**21-27 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter, ferdigfôr, planter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**4-10 egg**
Kull per år	**2-3**
Inkubasjon	**49-77 dager** ved 27-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Ikke vurdert (NE)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Hold dyret i et stort akvaterrarium, et kar eller en lukket dam, ikke i et vanlig terrarium.

TEMPERATUR
Vannet må være 21-27 °C. Luften over vannet må være 24-29 °C, og overflaten på solplassen må nå 30-35 °C, målt med et infrarødt termometer. Om natten kan temperaturen falle omtrent 3 °C, og om vinteren litt mer.

LUFTFUKTIGHET OG VANN
Skilpaddens fuktighet er vannet selv. Luftens relative fuktighet er ikke dokumentert for arten, og 50-70 % i rommet er et anslag.

VANN OG VANNKVALITET
Vannet er dyrets oppholdssted, så det må være dypt, rent og varmt. Vanndybden må minst tilsvare skjoldlengden, og 25-40 cm passer til voksne dyr; unger må ha grunnere vann. Temperaturen er 21-27 °C (se Temperatur).

LYS OG UVB
UVB er en nødvendighet: det gjør det mulig for dyret å danne D3-vitamin, ta opp kalk og få et sunt skjold. Ferguson-sonen er ikke dokumentert for arten; sone 3 er et anslag ut fra at arten soler seg mye.

FÔRING
Mauremys rivulata er altetende. I naturen er unge dyr overveiende kjøttetere, mens voksne i større grad spiser planter.

ATFERD OG HÅNDTERING
Mauremys rivulata er dagaktiv og sky: den dykker lynraskt når den forstyrres. Slekten er intelligent og lærer å forbinde deg med mat. Dyret liker ikke å bli håndtert.

NATURLIG UTBREDELSE
Albania, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Hellas, Israel, Det palestinske området, Jordan, Libanon, Nord-Makedonia, Montenegro, Serbia, Syria og Tyrkia.