herpy

SKILPADDER

# *Sternotherus odoratus*

*Sternotherus odoratus* er en liten, nesten helt vannlevende skilpadde fra det østlige Nord-Amerika. Skjoldet blir bare 8-13 cm, men dyret kan bli mange tiår gammelt. Arten er mest aktiv i skumringen og om natten, svømmer dårlig og trenger et filtrert kar med forholdsvis lavt vann, en varm lampe og UVB. Når den føler seg truet, avgir den en illeluktende væske.

Familie: Kinosternidae  Engelsk: Common Musk Turtle  Tidligere navn: *Kinosternon odoratum*  Publisert 16. november 2026

**FAKTABOKS**

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **8-13 cm**<br>total lengde inkl. hale |
| Levealder | **20-50 år** |
| Aktiv | **I skumringen og om natten** |
| Levevis | **Akvatisk** |
| Biotop | **Våtmark** |
| Vanskelighetsgrad | **Nybegynner** |

### STELL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **120 × 50 × 45 cm**<br>L × B × H for 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **24-29 °C** |
| Varmeplass | **30-35 °C** |
| Temperatur, natt | **20-24 °C** |
| Luftfuktighet | **50-80 %** |
| Vann | **Akvaterrarium**<br>dybde 15-25 cm |
| Vanntemperatur | **22-26 °C** |
| UVB | **Nødvendig**<br>Ferguson-sone 2 |
| Kosthold | **Insekter, ferdigfôr, planter, virveldyr og mark/snegler** |
| Holdes | **Alene eller parvis** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Eggleggende** |
| Kjønnsmoden | **48-120 mnd.** |
| Kullstørrelse | **1-6 egg** |
| Kull per år | **1-4** |
| Inkubasjon | **60-86 dager**<br>ved 25-28 °C |

### VERN OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Liste II** |
| EU-vedlegg | **Vedlegg B** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Stell i korte trekk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Hold dyret i et akvarium eller et lavt kar, ikke i et vanlig terrarium. Det må være minst ca. 15 liter vann per cm skjoldlengde, så et voksent dyr på 10-13 cm trenger 150-195 liter vann. |
| **TEMPERATUR** | Vannet skal være 22-26 °C, og en vannvarmer er normalt nødvendig. Unngå varmekabler eller varmematter under karet, fordi dyret går langs bunnen og kan brenne seg. Sett vannvarmeren bak en plastskjerm. |
| **LUFTFUKTIGHET OG VANN** | Skilpaddens fuktighet er selve vannet, så luftens relative fuktighet er ikke avgjørende og ikke nærmere dokumentert for arten. 50-80 % i rommet er rikelig. |
| **VANN OG VANNKVALITET** | Vannet er dyrets oppholdssted. Vanndybden er 15-25 cm for voksne dyr og lavere for unger, med grunnere partier der dyret kan hvile. |
| **LYS OG UVB** | UVB er nødvendig for at dyret skal kunne danne vitamin D3 og ta opp kalk. Selv om dyret ikke alltid kommer opp av vannet, må det være en solplass med lampe, slik at det kan velge. Ferguson-sonen er ikke dokumentert for arten. |
| **FÔRING** | *Sternotherus odoratus* er altetende, men for det meste kjøttetende. |
| **ATFERD OG HÅNDTERING** | *Sternotherus odoratus* er sky og går mest langs bunnen. Den er ikke et dyr å ta opp: den kan bite med sin lange, bevegelige hals og avgi en illeluktende væske. Må dyret flyttes, ta det bakerst på skjoldet og hold fingrene bakover. |
| **NATURLIG UTBREDELSE** | USA og Canada. |